

Länderbericht

WI-NI-A: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Hessen

**Auswertungsjahr 2026
Erfassungsjahr 2024**

Impressum

Titel	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung. Länderbericht. Auswertungsjahr 2026
Abgabe	29. Mai 2026

Auftraggeber

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Herausgeber

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin
verfahrenssupport@iqtig.org | www.iqtig.org | (030) 58 58 26-340

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Datengrundlagen	8
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten	8
Datengrundlage Sozialdaten	9
Ergebnisübersicht	10
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2024	12
Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen	13
Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)	13
1500: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	13
1502: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat- Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	15
332400: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat- Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	19
Details zu den Ergebnissen	23
Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)	29
1501: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	29
1503: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Implantat- Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	31
332401: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Implantat- Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	35
Details zu den Ergebnissen	39
332000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen)	46
Details zu den Ergebnissen	50

Basisauswertung.....	52
QS Dokumentation.....	52
NWIF Erfassungsjahr 2024.....	52
Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten.....	52
Bogenauslösende Kodes.....	53
Aufnahme und Entlassung.....	56
Aufenthaltsdauer im Krankenhaus.....	56
Patientin / Patient.....	57
Postoperative Wundinfektion.....	58
Sozialdaten.....	59
NWITR Erfassungsjahr 2024.....	59
Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten.....	59
Beginn und Ende der Behandlung.....	77
Falllänge.....	78
Patientin / Patient.....	78

Einleitung

Postoperative Wundinfektionen sind typische Komplikationen nach einer chirurgischen Operation. Sie stellen heute die zweithäufigste nosokomiale Infektionsart dar und sind ein Problem aller stationär und ambulant operierenden Fachgebiete (Behnke et al. 2017) [1]. Auch in hoch-entwickelten Gesundheitssystemen bedeuten postoperative Wundinfektionen ein relevantes Risiko für Patientinnen und Patienten und damit eine kontinuierliche Herausforderung an die Hygiene und den klinischen Infektionsschutz (Mielke et al. 2010) [2].

Das Verfahren QS WI soll niedergelassene Leistungserbringer und Krankenhäuser dabei unterstützen, nosokomiale postoperative Wundinfektionen zu reduzieren. Dazu werden jedem Leistungserbringer, durch den Tracer-Operationen erbracht wurden, die Raten von nosokomialen postoperativen Wundinfektionen in seiner Einrichtung im Vergleich zum Gesamtergebnis jeweils aller teilnehmenden Leistungserbringer getrennt nach ambulanten und stationären Operationen mitgeteilt sowie die Ergebnisse zu den Indikatoren zum Hygiene- und Infektionsmanagement.

Als Tracer-Operationen werden jene Operationen bezeichnet, die im Verfahren Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen (QS WI) ausgewählt wurden, um in der Qualitätssicherung dahingehend betrachtet zu werden, ob sich im Anschluss eine nosokomiale postoperative Wundinfektion entwickelt.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung – (DeQS-RL) (<https://www.g-ba.de/richtlinien/105/>) das Verfahren QS WI als sektorenübergreifendes Verfahren festgelegt. Im Verfahren QS WI wird entsprechend sowohl die Qualität von Leistungserbringern aus dem niedergelassenen Bereich als auch von Krankenhäusern gemessen und verglichen. So werden beispielsweise Leistungserbringer, die ambulante Operationen durchführen miteinander verglichen, unabhängig davon, ob es sich um Krankenhäuser oder niedergelassene Leistungserbringer handelt.

Das Verfahren QS WI umfasst insgesamt acht Qualitätsindikatoren, zwei zum Hygiene- und Infektionsmanagement und sechs zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen zum ambulanten und stationären Operieren, sowie zehn Kennzahlen.

Darüber hinaus werden seit dem Auswertungsjahr 2024 zwei Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit bezüglich des fallbezogenen QS-Dokumentationsbogens NWIF (Datensatz „Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen“) ausgewertet.

Von den acht Qualitätsindikatoren zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen beziehen sich zwei auf ambulante und vier auf stationäre Operationen. Zwei der vier Qualitätsindikatoren zu stationären Operationen beziehen sich auf tiefe Wundinfektionen (A2 und A3).

Die Kennzahlen beziehen sich auf die Sterblichkeit bis 30 Tage nach der OP und nosokomiale postoperative Infektionen mit multiresistenten Keimen. Sie dienen dazu, unterstützende Informationen für das interne Qualitätsmanagement bereitzustellen.

Zur Ermittlung der Indikatorergebnisse zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen werden Tracer-Operationen, entweder 30 Tage oder 90 Tage dahingehend nachbeobachtet, ob im Anschluss eine postoperative Wundinfektion diagnostiziert wird. Die Tracer-Operationen stammen aus der Chirurgie/Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie, Viszeralchirurgie, Plastischen Chirurgie, Orthopädie/Unfallchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Urologie und für den stationären Bereich zusätzlich aus der Herzchirurgie.

Im Krankenhaus wird bei Kodekonstellationen, die auf postoperative Wundinfektionen hinweisen können, ein kurzer fallbezogener QS-Dokumentationsbogen (Erfassungsmodul

NWIF) ausgelöst, der vom behandelnden Krankenhaus auszufüllen ist. Wird eine postoperative Wundinfektion diagnostiziert, so ist diese im Dokumentationsbogen vom jeweiligen Krankenhaus zu dokumentieren. Die Informationen aus dem Dokumentationsbogen werden an das IQTIG übermittelt.

Erst wenn diese Informationen am IQTIG mit den Datensätzen aus den Sozialdaten bei den Krankenkassen zusammengeführt werden, wird nach Berücksichtigung von Ausschlussgründen und Prüfung auf Passung, insbesondere des Follow-up-Zeitraumes, ermittelt, ob es sich bei einer von der Ärztin oder vom Arzt bestätigten postoperativen Wundinfektion um eine nosokomiale postoperative Wundinfektion nach Festlegung der DeQS-RL handelt. Hierbei werden nur postoperative Wundinfektionen (nach ambulanten und stationären Operationen im Krankenhaus oder im niedergelassenen Bereich) berücksichtigt, die stationär diagnostiziert wurden.

Die Information zur nosokomialen postoperativen Wundinfektion geht in den Zähler des Indikators ein, dessen Ergebnis wiederum an die Einrichtung zurückgespiegelt wird, die die Tracer-Operation durchgeführt hat. Im Nenner steht die über die Sozialdaten bei den Krankenkassen ermittelte Gesamtzahl der Tracer-Operationen des jeweiligen Leistungserbringers.

Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die ca. 2,9 Mio. Tracer-Operationen (EJ 2023) nicht gesondert dokumentiert werden müssen. Gleichzeitig müssen über den QS-Dokumentationsfilter in Krankenhäusern möglichst viele Fälle mit postoperativer Wundinfektion ausgelöst werden, damit möglichst sämtliche postoperativen Wundinfektionen, die zu einer der Tracer-Operationen gehören können, an das IQTIG übermittelt werden. Da es keinen Code gibt, der hierzu ausreichend spezifisch ist, wird ein Filter genutzt, der beim potentiellen Vorliegen einer postoperativen Wundinfektion auslöst. Dieser Filter löst ca. 310.000-mal einen QS-Dokumentationsbogen aus.

Liegt keine postoperative Wundinfektion vor, muss in der Regel nur die Frage nach der postoperativen Wundinfektion mit „nein“ beantwortet werden. Ca. 75.000-mal wurde diese Frage im EJ 2023 mit „ja“ beantwortet, also eine postoperative Wundinfektion bestätigt. Ca. 35 % dieser dokumentierten postoperativen Wundinfektionen konnten mit einer Tracer-Operation verknüpft werden und gehen in einen der Indikatoren als Zählerfall ein. Das Verfahren ist somit sehr effizient. Denn auf der einen Seite mussten im EJ 2023 zwar ca. 230.000 Bögen dokumentiert werden, die am Ende nicht für die QIs genutzt werden können (wobei in den meisten Fällen nur eine Frage beantwortet werden muss). Damit wird jedoch auf der anderen Seite ermöglicht, dass zu ca. 2,9 Mio. Operationen keine zusätzliche Dokumentation (neben der Dokumentation für die Abrechnung) anfällt.

Da es im niedergelassenen Bereich keine QS-Dokumentation gibt, müssen hier keine Daten zusätzlich erfasst werden. Niedergelassene Leistungserbringer, die ambulant operieren erhalten so in diesem QS-Verfahren Ergebnisse zu Indikatoren zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen gänzlich ohne QS-bezogenen Dokumentationsaufwand.

Möglich ist die Verknüpfung von Sozialdaten und Dokumentationsdaten der Leistungserbringer über ein in beiden Datenpools vorliegendes, je Patient gleichlautendes Patientenpseudonym. Das Zusammenführen der Datensätze erfolgt unabhängig davon, ob Operation und Wundinfektionsdiagnose in derselben oder in unterschiedlichen Einrichtungen erfolgten, und auch unabhängig davon, ob die Tracer-Operation ambulant oder stationär durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse zu den Indikatoren zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen werden im Jahr zwei nach der Erfassung bereitgestellt. Grund dafür ist die Nutzung von Sozialdaten bei den Krankenkassen, deren Bereitstellung mit einem deutlichen Zeitverzug verbunden ist.

Informationen zu den je Leistungserbringer ermittelten Patienten, zu denen in den Daten eine

oder mehrere Tracer-Operationen mit einer postoperativen Wundinfektion verknüpft wurden, sind in den separat bereitgestellten ATR-Listen aufgeführt.

Detaillierte Informationen zu den Qualitätsindikatoren können den aktuellen endgültigen Rechenregeln entnommen werden, sobald sie vom G-BA beschlossen wurden.

Ein Leistungserbringerergebnis gilt als rechnerisch auffällig, wenn es außerhalb des Referenzbereichs liegt.

[1] Behnke, M; Aghdassi, SJ; Hansen, S; Peña Diaz, LA; Gastmeier, P; Piening, B (2017): Prävalenz von nosokomialen Infektionen und Antibiotika-Anwendung in deutschen Krankenhäusern. Deutsches Ärzteblatt 114(50): 851-857. DOI: 10.3238/arztebl.2017.0851.

[2] Mielke, M; Bölt, U; Geffers, C (2010): Basisdaten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland – nosokomiale Infektionen. Epidemiologisches Bulletin, Nr. 36: 359-364. URL: https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2010/36_10.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am: 16.05.2025).

Spezifische Hinweise zu dieser Jahresauswertung:

Das Qualitätssicherungsverfahren befindet sich gemäß § 19 der themenspezifischen Bestimmungen zum Verfahren QS WI der DeQS-Richtlinie weiterhin in Erprobung. In diesem Zeitraum soll die Funktionalität des QS-Verfahrens geprüft und optimiert werden. Dies wurde insbesondere aufgrund der komplexen Datenzusammenführung und der neuartigen Datenquellen bzw. Erhebungsmethoden (Sozialdaten bei den Krankenkassen und einrichtungsbezogene QS-Dokumentation) als sinnvoll erachtet. Die Ergebnisse mit der entsprechend gebotenen Vorsicht zu interpretieren. Im Begleitdokument zu dieser Auswertung, wird gesondert auf die aktuell bekannten Limitationen eingegangen.

Aufgrund der Aussetzung der Erfassung von Daten zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen für das EJ 2021, enthält der vorliegende Bericht keine Ergebnisse für das EJ 2021.

Zu diesem Bericht steht unter <https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/> eine Leseanleitung inkl. Glossar und unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/biometrische-grundlagen/biometrische-methodik-zur-risikoadjustierung/> die Erläuterungen zur Risikoadjustierung zum Download zur Verfügung.

Datengrundlagen

Dieser Bericht enthält Qualitätsindikatorenergebnisse, die auf QS-Dokumentationsdaten und Informationen aus den Sozialdaten bei den Krankenkassen basieren. Diese fallbezogenen QS-Dokumentationsdaten werden ausschließlich von Krankenhäusern übermittelt.

Die nachfolgenden Tabellen stellen die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) mit Entlassung im Erfassungsjahr 2024 und die daraus resultierende Vollzähligkeit auf Landes- und Bundesebene dar.

Entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch für die Erstellung der Sollstatistik zuständig war.

Die Vollzähligkeit der QS-Dokumentationsbögen wird auf Standortebene ermittelt. Für die Auswertungsmodule WI-NI-A und WI-NI-S des QS-Verfahrens QS WI erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nicht bezogen auf die in der Tabelle aufgeführte Anzahl Leistungserbringer, sondern bezogen auf die Leistungserbringer (IKNR bzw. BSNR-Ebene), für die Informationen zu Tracer-Operationen aus den Sozialdaten bei den Krankenkassen vorliegen.

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Erfassungsjahr 2024		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Land	Datensätze gesamt Basisdatensatz	21.107 21.107	21.012	100,45
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Land	118	126	93,65

Erfassungsjahr 2024		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt Basisdatensatz	318.573 318.573	318.554	100,01
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Bund (gesamt)	1.592	1.602	99,38

Datengrundlage Sozialdaten

Die nachfolgende Tabelle „Übermittelte Fälle mit Tracer-Operationen (NWITR)“ stellt die von den Krankenkassen übermittelten Sozialdaten (Spalte „Anzahl Datensätze“) zu Traceroperationen sowie die Anzahl der Leistungserbringer, zu denen Sozialdaten übermittelt wurden (Spalte „Anzahl Leistungserbringer“) dar.

Die Anzahl der Datensätze wird bezogen auf das ambulante und stationäre Operieren ausgegeben, und bezogen auf das ambulante Operieren darüber hinaus auch für Vergleichsgruppen (Krankenhäuser oder Praxen/Medizinische Versorgungszentren (MVZ)).

Für die Auswertungsmodule WI-NI-A und WI-NI-S des QS-Verfahrens QS WI erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen bezogen auf die Leistungserbringer (IKNR bzw. BSNR-Ebene), für die Informationen zu Tracer-Operationen aus den Sozialdaten bei den Krankenkassen vorliegen.

Übermittelte Fälle mit Tracer-Operationen (NWITR)

EJ 2024	Anzahl Datensätze	Anzahl Leistungserbringer
Bund (Ambulantes Operieren)	636.707	5.258
Bund (Amb. Krankenhäuser)	170.234	1.061
Bund (Amb. Praxen/MVZ)	456.767	3.832
Bund (Selektivvertragliche Leistungen)	9.706	830
Bund (Stationäres Operieren)	2.179.122	1.132

Ergebnisübersicht

Der vorliegende Bericht enthält ausschließlich die Ergebnisse zu Qualitätsindikatoren zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen bezogen auf ambulant operierende Leistungserbringer. Indikatorergebnisse zu den Indikatoren zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen stationär operierender Leistungserbringer, zum Hygiene- und Infektionsmanagement können den hierzu separat bereitgestellten Berichten entnommen werden. Leistungserbringer, die ausschließlich Daten bezogen auf das ambulante oder stationäre Operieren geliefert haben, erhalten nur einen Bericht. Für Krankenhäuser sind die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien bezüglich der Vollständigkeit der QS-Dokumentation zur Erfassung nosokomialer postoperativer Wundinfektionen (WI-NI-D) ebenfalls einem separat bereitgestellten Bericht zu entnehmen.

Bitte beachten Sie Folgendes zu den Ergebnissen:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bezogen auf das Erfassungsjahr 2023 an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Die Auswertungen der Indikatoren zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen beziehen sich auf Tracer-Operationen, die innerhalb des jeweiligen Erfassungsjahres durchgeführt worden sind. Informationen zu postoperativen Wundinfektionen können zu den aktuellen Ergebnissen des Auswertungsjahr 2025 auch aus dem jeweiligen Folgejahr stammen.
- Werden Ergebnisse von zwei oder mehr Jahren miteinander verglichen, so werden für alle Erfassungsjahre die aktuellsten Rechenregeln und auch Referenzbereiche angewandt.
- Werden im intertemporalen Vergleich bei einzelnen Qualitätsindikatoren keine Ergebnisse angezeigt, so konnten diese bspw. für ein zurückliegendes Jahr aufgrund von fehlenden Daten nicht berechnet werden. Dieser Fall kann u. a. dann auftreten, wenn der QS-Dokumentationsbogen zwischen zwei Jahren angepasst wurde und Felder, welche zur Berechnung der Qualitätsindikatoren notwendig sind, für die Vorjahre nicht verfügbar sind. Auch kann es sein, dass ein Leistungserbringer bestimmte Leistungen in einem Vorjahr nicht angeboten oder erfasst hatte und damit keine Daten für einen Vergleich vorhanden sind. Zudem kann es sein, dass ein Standort im Zeitverlauf nicht mehr vorhanden bzw. neu hinzugekommen ist, so dass ggf. keine Standortinformationen zu den Vorjahren vorliegen.
- Die Berichterstattung findet mit einem zeitlichen Versatz statt. Qualitätsindikatorenergebnisse, die auf Sozialdaten bei den Krankenkassen basieren, können erst im Jahr zwei nach dem Erfassungsjahr bereitgestellt werden. Entsprechend werden in diesem Bericht die Ergebnisse zum Erfassungsjahr 2023 dargestellt. Ergebnisse zum Erfassungsjahr 2021 werden aufgrund der Aussetzung der Datenerfassung für das Jahr 2021 nicht dargestellt.

Auf der nächsten Seite finden Sie in der Tabelle „Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2023“ die Ergebnisse der Indikatoren und Kennzahlen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren inklusive der Vorjahresergebnisse finden Sie im Kapitel „Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen“.

Informationen zu bekannten Limitationen der Datenbasis können Sie dem Begleitschreiben entnehmen.

Weitere Informationen zu dem Verfahren QS WI finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-wi/>. Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir->

arbeiten/grundlagen/ sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2024

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Ergebnis
Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)				
1500	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	Nicht definiert	O = 34 N = 57.215	O = 552 N = 567.980
1502	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	Transparenzkennzahl	x % O = ≤3 N = 57.215	0,00 % O = 9 N = 567.980
332400	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	Transparenzkennzahl	0,00 % O = 0 N = 57.215	0,00 % O = 0 N = 567.980
Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)				
1501	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	Nicht definiert	O = 4 N = 5.720	O = 98 N = 56.644
1503	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	Transparenzkennzahl	0,00 % O = 0 N = 5.720	x % O = ≤3 N = 56.644
332401	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	Transparenzkennzahl	0,00 % O = 0 N = 5.720	0,00 % O = 0 N = 56.644
332000	30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen)	Transparenzkennzahl	0,00 % O = 0 N = 25	0,88 % O = 4 N = 457

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)

Qualitätsziel	Die Anzahl an nosokomialen postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.
----------------------	---

1500: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Zähler	Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
Referenzbereich	Nicht definiert
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten, Sozialdaten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 1/2025

Detailergebnisse

Dimension		Ergebnis O/N	Anzahl Ereignisse (O)
Ihr Ergebnis	2022	32 / 55.274	32
	2023	44 / 59.843	44
	2024	34 / 57.215	34
Ambulant	VÄ	2022	209 / 425.129
		2023	239 / 472.606
		2024	211 / 431.384
	KH	2022	256 / 135.930
		2023	366 / 161.220
		2024	341 / 136.596
Selektivvertragliche Leistungen	2022	0 / 0	0
	2023	0 / 0	0
	2024	0 / 0	0

Dimension		Ergebnis O/N	Anzahl Ereignisse (O)
Bund	2022	465 / 561.059	465
	2023	605 / 633.826	605
	2024	552 / 567.980	552

Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2024	4.860	0	0,00	0,50	0,00

1502: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Zähler	Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
Datenquellen	QS-Daten, Sozialdaten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 1/2025

Detailergebnisse

Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %	
Ihr Ergebnis		2022	0 / 55.274	0,00	0,00 - 0,01
		2023	0 / 59.843	0,00	0,00 - 0,01
		2024	≤3 / 57.215	x	0,00 - 0,01
Ambulant	VÄ	2022	≤3 / 425.129	x	0,00 - 0,00
		2023	≤3 / 472.606	x	0,00 - 0,00
		2024	5 / 431.384	0,00	0,00 - 0,00
	KH	2022	≤3 / 135.930	x	0,00 - 0,00
		2023	4 / 161.220	0,00	0,00 - 0,01
		2024	4 / 136.596	0,00	0,00 - 0,01
Selektivvertragliche Leistungen		2022	0 / 0	-	-
		2023	0 / 0	-	-
		2024	0 / 0	-	-
Bund		2022	≤3 / 561.059	x	0,00 - 0,00
		2023	5 / 633.826	0,00	0,00 - 0,00
		2024	9 / 567.980	0,00	0,00 - 0,00

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	4.860	0	0,00	2,08	0,00

332400: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Zähler	Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
Datenquellen	QS-Daten, Sozialdaten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 1/2025

Detaillierergebnisse


Dimension			Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis		2022	0 / 55.274	0,00	0,00 - 0,01
		2023	0 / 59.843	0,00	0,00 - 0,01
		2024	0 / 57.215	0,00	0,00 - 0,01
Ambulant	VÄ	2022	0 / 425.129	0,00	0,00 - 0,00
		2023	0 / 472.606	0,00	0,00 - 0,00
		2024	0 / 431.384	0,00	0,00 - 0,00
	KH	2022	≤3 / 135.930	x	0,00 - 0,00
		2023	0 / 161.220	0,00	0,00 - 0,00
		2024	0 / 136.596	0,00	0,00 - 0,00
Selektivvertragliche Leistungen		2022	0 / 0	-	-
		2023	0 / 0	-	-
		2024	0 / 0	-	-
Bund		2022	≤3 / 561.059	x	0,00 - 0,00
		2023	0 / 633.826	0,00	0,00 - 0,00
		2024	0 / 567.980	0,00	0,00 - 0,00

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse nach Vergleichsgruppen



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	4.860	0	0,00	0,00	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	ID: 1500 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat- Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	34/57.215	552/567.980
1.1.1	Diagnosestellung		
1.1.1.1	ID: 33_24023 Selbstdiagnostiziert ¹	38,24 % 13/34	53,99 % 298/552
1.1.1.2	ID: 33_24024 Fremddiagnostiziert ²	61,76 % 21/34	46,01 % 254/552

¹ bei selbstdiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde.

² bei fremddiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion nicht beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde, sondern bei einem anderen Leistungserbringer.

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.2	ID: 1500 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up) ³	0,00 34/57.215	0,00 552/567.980
1.2.1	ID: 33_25028 Operationen an Lunge und Bronchus (5-32...5-34)	0,00 % 0/4	0,00 % 0/102
1.2.2	ID: 33_25029 Operationen am Herzen (5-35...5-37)	- 0/0	0,00 % 0/9
1.2.3	ID: 33_25030 Operationen an den Blutgefäßen (5-38...5-39)	0,21 % 6/2.909	0,26 % 108/42.262
1.2.4	ID: 33_25031 Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem (5-40...5-41)	- 0/0	- 0/0
1.2.5	ID: 33_25032 Operationen am Verdauungstrakt (5-42...5-54)	0,00 % 0/531	0,28 % 17/5.986
1.2.6	ID: 33_25033 Operationen an den Harnorganen (5-55...5-59)	- 0/0	- 0/0
1.2.7	ID: 33_25034 Operationen an den männlichen Genitalorganen (5-60...5-64)	x % ≤3/340	0,57 % 21/3.696

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.2.8	ID: 33_25035 Operationen an den weiblichen Genitalorganen (5-65...5-71)	0,00 % 0/535	0,09 % 7/7.773
1.2.9	ID: 33_25036 Geburtshilfliche Operationen (5-72...5-75)	0,00 % 0/29	0,00 % 0/352
1.2.10	ID: 33_25037 Operationen an den Bewegungsorganen (5-78...5-86)	0,05 % 27/52.422	0,08 % 392/500.604
1.2.11	ID: 33_25038 Operationen an der Mamma (5-87...5-88)	0,00 % 0/502	0,09 % 7/7.830

³ gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.3	ID: 1500 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	0,00 34/57.215	0,00 552/567.980
1.3.1	Tage bis zum Auftreten einer nosokomialen postoperativen Wundinfektion		
1.3.1.1	ID: 33_24020 ≤ 10 Tage	55,88 % 19/34	47,10 % 260/552
1.3.1.2	ID: 33_24021 11 - 20 Tage	32,35 % 11/34	36,78 % 203/552
1.3.1.3	ID: 33_24022 21 - 30 Tage	11,76 % 4/34	16,12 % 89/552

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.4	ID: 1502 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin- resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Nicht- Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	x % ≤3/57.215	0,00 % 9/567.980
1.4.1	Diagnosestellung		
1.4.1.1	ID: 33_24034 Selbstdiagnostiziert ⁴	x % ≤3	44,44 % 4/9

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.4.1.2	ID: 33_24035 Fremddiagnostiziert ⁵	x % ≤3	55,56 % 5/9

⁴ bei selbstdiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde.

⁵ bei fremddiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion nicht beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde, sondern bei einem anderen Leistungserbringer.

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.5	ID: 1502 Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up) ⁶	x % ≤3/57.215	0,00 % 9/567.980
1.5.1	ID: 33_25039 Operationen an Lunge und Bronchus (5-32...5-34)	0,00 % 0/4	0,00 % 0/102
1.5.2	ID: 33_25040 Operationen am Herzen (5-35...5-37)	- 0/0	0,00 % 0/9
1.5.3	ID: 33_25041 Operationen an den Blutgefäßen (5-38...5-39)	0,00 % 0/2.909	x % ≤3/42.262
1.5.4	ID: 33_25042 Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem (5-40...5-41)	- 0/0	- 0/0
1.5.5	ID: 33_25043 Operationen am Verdauungstrakt (5-42...5-54)	0,00 % 0/531	0,00 % 0/5.986
1.5.6	ID: 33_25044 Operationen an den Harnorganen (5-55...5-59)	- 0/0	- 0/0
1.5.7	ID: 33_25045 Operationen an den männlichen Genitalorganen (5-60...5-64)	0,00 % 0/340	0,00 % 0/3.696
1.5.8	ID: 33_25046 Operationen an den weiblichen Genitalorganen (5-65...5-71)	0,00 % 0/535	0,00 % 0/7.773
1.5.9	ID: 33_25047 Geburtshilfliche Operationen (5-72...5-75)	0,00 % 0/29	0,00 % 0/352
1.5.10	ID: 33_25048 Operationen an den Bewegungsorganen (5-78...5-86)	x % ≤3/52.422	0,00 % 8/500.604
1.5.11	ID: 33_25049 Operationen an der Mamma (5-87...5-88)	0,00 % 0/502	0,00 % 0/7.830

⁶ gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.6	ID: 1502 Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	x % ≤3/57.215	0,00 % 9/567.980
1.6.1	Tage bis zum Auftreten einer nosokomialen postoperativen Wundinfektion		
1.6.1.1	ID: 33_24036 ≤ 10 Tage	x % ≤3	x % ≤3/9
1.6.1.2	ID: 33_24037 11 - 20 Tage	x % ≤3	66,67 % 6/9
1.6.1.3	ID: 33_24038 21 - 30 Tage	x % ≤3	0,00 % 0/9

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.7	ID: 332400 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	0,00 % 0/57.215	0,00 % 0/567.980
1.7.1	Diagnosestellung		
1.7.1.1	ID: 33_25000 Selbstdiagnostiziert ⁷	- 0/0	- 0/0
1.7.1.2	ID: 33_25001 Fremddiagnostiziert ⁸	- 0/0	- 0/0

⁷ bei selbstdiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde.

⁸ bei fremddiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion nicht beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde, sondern bei einem anderen Leistungserbringer.

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.8	ID: 332400 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up) ⁹	0,00 % 0/57.215	0,00 % 0/567.980

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.8.1	ID: 33_25050 Operationen an Lunge und Bronchus (5-32...5-34)	0,00 % 0/4	0,00 % 0/102
1.8.2	ID: 33_25051 Operationen am Herzen (5-35...5-37)	- 0/0	0,00 % 0/9
1.8.3	ID: 33_25052 Operationen an den Blutgefäßen (5-38...5-39)	0,00 % 0/2.909	0,00 % 0/42.262
1.8.4	ID: 33_25053 Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem (5-40...5-41)	- 0/0	- 0/0
1.8.5	ID: 33_25054 Operationen am Verdauungstrakt (5-42...5-54)	0,00 % 0/531	0,00 % 0/5.986
1.8.6	ID: 33_25055 Operationen an den Harnorganen (5-55...5-59)	- 0/0	- 0/0
1.8.7	ID: 33_25056 Operationen an den männlichen Genitalorganen (5-60...5-64)	0,00 % 0/340	0,00 % 0/3.696
1.8.8	ID: 33_25057 Operationen an den weiblichen Genitalorganen (5-65...5-71)	0,00 % 0/535	0,00 % 0/7.773
1.8.9	ID: 33_25058 Geburtshilfliche Operationen (5-72...5-75)	0,00 % 0/29	0,00 % 0/352
1.8.10	ID: 33_25059 Operationen an den Bewegungsorganen (5-78...5-86)	0,00 % 0/52.422	0,00 % 0/500.604
1.8.11	ID: 33_25060 Operationen an der Mamma (5-87...5-88)	0,00 % 0/502	0,00 % 0/7.830

⁹ gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.9	ID: 332400 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	0,00 % 0/57.215	0,00 % 0/567.980
1.9.1	Tage bis zum Auftreten einer nosokomialen postoperativen Wundinfektion		

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.9.1.1	ID: 33_25008 ≤ 10 Tage	- 0/0	- 0/0
1.9.1.2	ID: 33_25009 11 - 20 Tage	- 0/0	- 0/0
1.9.1.3	ID: 33_25010 21 - 30 Tage	- 0/0	- 0/0

Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)

Qualitätsziel	Die Anzahl an nosokomialen postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.
---------------	---

1501: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Zähler	Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
Referenzbereich	Nicht definiert
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten, Sozialdaten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 1/2025

Detailergebnisse

Dimension			Ergebnis O/N	Anzahl Ereignisse (O)
Ihr Ergebnis		2022	≤3 / 5.154	≤3
		2023	6 / 6.698	6
		2024	4 / 5.720	4
Ambulant	VÄ	2022	16 / 23.067	16
		2023	19 / 27.425	19
		2024	15 / 23.654	15
	KH	2022	76 / 31.312	76
		2023	70 / 40.820	70
		2024	83 / 32.990	83
Selektivvertragliche Leistungen		2022	0 / 0	0
		2023	0 / 0	0
		2024	0 / 0	0

Dimension		Ergebnis O/N	Anzahl Ereignisse (O)
Bund	2022	92 / 54.379	92
	2023	89 / 68.245	89
	2024	98 / 56.644	98

Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2024	2.516	0	0,00	1,00	0,00

1503: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Zähler	Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
Datenquellen	QS-Daten, Sozialdaten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 1/2025

Detaillergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %	
Ihr Ergebnis		2022	≤3 / 5.154	x	0,00 - 0,11
		2023	≤3 / 6.698	x	0,00 - 0,08
		2024	0 / 5.720	0,00	0,00 - 0,07
Ambulant	VÄ	2022	0 / 23.067	0,00	0,00 - 0,02
		2023	0 / 27.425	0,00	0,00 - 0,01
		2024	≤3 / 23.654	x	0,00 - 0,02
	KH	2022	≤3 / 31.312	x	0,00 - 0,02
		2023	≤3 / 40.820	x	0,00 - 0,01
		2024	0 / 32.990	0,00	0,00 - 0,01
Selektivvertragliche Leistungen		2022	0 / 0	-	
		2023	0 / 0	-	-
		2024	0 / 0	-	-
Bund		2022	≤3 / 54.379	x	0,00 - 0,01
		2023	≤3 / 68.245	x	0,00 - 0,01
		2024	≤3 / 56.644	x	0,00 - 0,01

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse nach Vergleichsgruppen



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	2.516	0	0,00	0,68	0,00

332401: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Zähler	Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
Datenquellen	QS-Daten, Sozialdaten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 1/2025

Detaillergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %	
Ihr Ergebnis		2022	0 / 5.154	0,00	0,00 - 0,07
		2023	0 / 6.698	0,00	0,00 - 0,06
		2024	0 / 5.720	0,00	0,00 - 0,07
Ambulant	VÄ	2022	0 / 23.067	0,00	0,00 - 0,02
		2023	0 / 27.425	0,00	0,00 - 0,01
		2024	0 / 23.654	0,00	0,00 - 0,02
	KH	2022	0 / 31.312	0,00	0,00 - 0,01
		2023	0 / 40.820	0,00	0,00 - 0,01
		2024	0 / 32.990	0,00	0,00 - 0,01
Selektivvertragliche Leistungen		2022	0 / 0	-	-
		2023	0 / 0	-	-
		2024	0 / 0	-	-
Bund		2022	0 / 54.379	0,00	0,00 - 0,01
		2023	0 / 68.245	0,00	0,00 - 0,01
		2024	0 / 56.644	0,00	0,00 - 0,01

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse nach Vergleichsgruppen



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	2.516	0	0,00	0,00	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.1	ID: 1501 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	4/5.720	98/56.644
2.1.1	Diagnosestellung		
2.1.1.1	ID: 33_24018 Selbstdiagnostiziert ¹⁰	x % ≤3/4	69,39 % 68/98
2.1.1.2	ID: 33_24019 Fremddiagnostiziert ¹¹	x % ≤3/4	30,61 % 30/98

¹⁰ bei selbstdiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde.

¹¹ bei fremddiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion nicht beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde, sondern bei einem anderen Leistungserbringer.

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.2	ID: 1501 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up) ¹²	0,00 4/5.720	0,00 98/56.644
2.2.1	ID: 33_25061 Operationen an Lunge und Bronchus (5-32...5-34)	- 0/0	- 0/0
2.2.2	ID: 33_25062 Operationen am Herzen (5-35...5-37)	x % ≤3/629	0,31 % 23/7.334
2.2.3	ID: 33_25063 Operationen an den Blutgefäßen (5-38...5-39)	0,00 % 0/8	0,00 % 0/61
2.2.4	ID: 33_25064 Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem (5-40...5-41)	- 0/0	- 0/0
2.2.5	ID: 33_25065 Operationen am Verdauungstrakt (5-42...5-54)	x % ≤3/212	0,56 % 10/1.770
2.2.6	ID: 33_25066 Operationen an den Harnorganen (5-55...5-59)	- 0/0	- 0/0
2.2.7	ID: 33_25067 Operationen an den männlichen Genitalorganen (5-60...5-64)	- 0/0	- 0/0

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.2.8	ID: 33_25068 Operationen an den weiblichen Genitalorganen (5-65...5-71)	x % ≤3	x % ≤3
2.2.9	ID: 33_25069 Geburtshilfliche Operationen (5-72...5-75)	- 0/0	- 0/0
2.2.10	ID: 33_25070 Operationen an den Bewegungsorganen (5-78...5-86)	x % ≤3/4.874	0,14 % 65/47.472
2.2.11	ID: 33_25071 Operationen an der Mamma (5-87...5-88)	- 0/0	0,00 % 0/16

¹² gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.3	ID: 1501 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	0,00 4/5.720	0,00 98/56.644
2.3.1	Tage bis zum Auftreten einer nosokomialen postoperativen Wundinfektion		
2.3.1.1	ID: 33_24025 ≤ 10 Tage	x % ≤3/4	20,41 % 20/98
2.3.1.2	ID: 33_24026 11 - 20 Tage	x % ≤3/4	24,49 % 24/98
2.3.1.3	ID: 33_24027 21 - 30 Tage	x % ≤3/4	20,41 % 20/98
2.3.1.4	ID: 33_24028 31 - 40 Tage	0,00 % 0/4	11,22 % 11/98
2.3.1.5	ID: 33_24029 41 - 50 Tage	0,00 % 0/4	10,20 % 10/98
2.3.1.6	ID: 33_24030 51 - 60 Tage	0,00 % 0/4	5,10 % 5/98
2.3.1.7	ID: 33_24031 61 - 70 Tage	0,00 % 0/4	x % ≤3/98
2.3.1.8	ID: 33_24032 71 - 80 Tage	0,00 % 0/4	x % ≤3/98
2.3.1.9	ID: 33_24033 81 - 90 Tage	0,00 % 0/4	x % ≤3/98

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.4	ID: 1503 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin- resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Implantat- Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	0,00 % 0/5.720	x % ≤3/56.644
2.4.1	Diagnosestellung		
2.4.1.1	ID: 33_24039 Selbstdiagnostiziert ¹³	- 0/0	x % ≤3
2.4.1.2	ID: 33_24040 Fremddiagnostiziert ¹⁴	- 0/0	x % ≤3

¹³ bei selbstdiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde.

¹⁴ bei fremddiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion nicht beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde, sondern bei einem anderen Leistungserbringer.

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.5	ID: 1503 Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up) ¹⁵	0,00 % 0/5.720	x % ≤3/56.644
2.5.1	ID: 33_25072 Operationen an Lunge und Bronchus (5-32...5-34)	- 0/0	- 0/0
2.5.2	ID: 33_25073 Operationen am Herzen (5-35...5-37)	0,00 % 0/629	0,00 % 0/7.334
2.5.3	ID: 33_25074 Operationen an den Blutgefäßen (5-38...5-39)	0,00 % 0/8	0,00 % 0/61
2.5.4	ID: 33_25075 Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem (5-40...5-41)	- 0/0	- 0/0
2.5.5	ID: 33_25076 Operationen am Verdauungstrakt (5-42...5-54)	0,00 % 0/212	0,00 % 0/1.770
2.5.6	ID: 33_25077 Operationen an den Harnorganen (5-55...5-59)	- 0/0	- 0/0
2.5.7	ID: 33_25078 Operationen an den männlichen Genitalorganen (5-60...5-64)	- 0/0	- 0/0

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.5.8	ID: 33_25079 Operationen an den weiblichen Genitalorganen (5-65...5-71)	x % ≤3	x % ≤3
2.5.9	ID: 33_25080 Geburtshilfliche Operationen (5-72...5-75)	- 0/0	- 0/0
2.5.10	ID: 33_25081 Operationen an den Bewegungsorganen (5-78...5-86)	0,00 % 0/4.874	x % ≤3/47.472
2.5.11	ID: 33_25082 Operationen an der Mamma (5-87...5-88)	- 0/0	0,00 % 0/16

¹⁵ gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.6	ID: 1503 Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulantem Operationen (Implantat- Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	0,00 % 0/5.720	x % ≤3/56.644
2.6.1	Tage bis zum Auftreten einer nosokomialen postoperativen Wundinfektion		
2.6.1.1	ID: 33_24041 ≤ 10 Tage	- 0/0	x % ≤3
2.6.1.2	ID: 33_24042 11 - 20 Tage	- 0/0	x % ≤3
2.6.1.3	ID: 33_24043 21 - 30 Tage	- 0/0	x % ≤3
2.6.1.4	ID: 33_24044 31 - 40 Tage	- 0/0	x % ≤3
2.6.1.5	ID: 33_24045 41 - 50 Tage	- 0/0	x % ≤3
2.6.1.6	ID: 33_24046 51 - 60 Tage	- 0/0	x % ≤3
2.6.1.7	ID: 33_24047 61 - 70 Tage	- 0/0	x % ≤3
2.6.1.8	ID: 33_24048 71 - 80 Tage	- 0/0	x % ≤3
2.6.1.9	ID: 33_24049 81 - 90 Tage	- 0/0	x % ≤3

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.7	ID: 332401 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	0,00 % 0/5.720	0,00 % 0/56.644
2.7.1	Diagnosestellung		
2.7.1.1	ID: 33_25011 Selbstdiagnostiziert ¹⁶	- 0/0	- 0/0
2.7.1.2	ID: 33_25012 Fremddiagnostiziert ¹⁷	- 0/0	- 0/0

¹⁶ bei selbstdiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde.

¹⁷ bei fremddiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion nicht beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde, sondern bei einem anderen Leistungserbringer.

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.8	ID: 332401 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up) ¹⁸	0,00 % 0/5.720	0,00 % 0/56.644
2.8.1	ID: 33_25083 Operationen an Lunge und Bronchus (5-32...5-34)	- 0/0	- 0/0
2.8.2	ID: 33_25084 Operationen am Herzen (5-35...5-37)	0,00 % 0/629	0,00 % 0/7.334
2.8.3	ID: 33_25085 Operationen an den Blutgefäßen (5-38...5-39)	0,00 % 0/8	0,00 % 0/61
2.8.4	ID: 33_25086 Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem (5-40...5-41)	- 0/0	- 0/0
2.8.5	ID: 33_25087 Operationen am Verdauungstrakt (5-42...5-54)	0,00 % 0/212	0,00 % 0/1.770
2.8.6	ID: 33_25088 Operationen an den Harnorganen (5-55...5-59)	- 0/0	- 0/0

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.8.7	ID: 33_25089 Operationen an den männlichen Genitalorganen (5-60...5-64)	- 0/0	- 0/0
2.8.8	ID: 33_25090 Operationen an den weiblichen Genitalorganen (5-65...5-71)	x % ≤3	x % ≤3
2.8.9	ID: 33_25091 Geburtshilfliche Operationen (5-72...5-75)	- 0/0	- 0/0
2.8.10	ID: 33_25092 Operationen an den Bewegungsorganen (5-78...5-86)	0,00 % 0/4.874	0,00 % 0/47.472
2.8.11	ID: 33_25093 Operationen an der Mamma (5-87...5-88)	- 0/0	0,00 % 0/16

¹⁸ gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.9	ID: 332401 Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Implantat- Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	0,00 % 0/5.720	0,00 % 0/56.644
2.9.1	Tage bis zum Auftreten einer nosokomialen postoperativen Wundinfektion		
2.9.1.1	ID: 33_25019 ≤ 10 Tage	- 0/0	- 0/0
2.9.1.2	ID: 33_25020 11 - 20 Tage	- 0/0	- 0/0
2.9.1.3	ID: 33_25021 21 - 30 Tage	- 0/0	- 0/0
2.9.1.4	ID: 33_25022 31 - 40 Tage	- 0/0	- 0/0
2.9.1.5	ID: 33_25023 41 - 50 Tage	- 0/0	- 0/0
2.9.1.6	ID: 33_25024 51 - 60 Tage	- 0/0	- 0/0
2.9.1.7	ID: 33_25025 61 - 70 Tage	- 0/0	- 0/0
2.9.1.8	ID: 33_25026 71 - 80 Tage	- 0/0	- 0/0

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.9.1.9	ID: 33_25027 81 - 90 Tage	- 0/0	- 0/0

332000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen)


Qualitätsziel	Möglichst geringe Sterblichkeit
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle ambulanten Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
Zähler	Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose der Infektion verstorben sind
Datenquellen	QS-Daten, Sozialdaten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 1/2025

Detaillergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %	
Ihr Ergebnis		2022	0 / 25	0,00	0,00 - 13,32
		2023	0 / 37	0,00	0,00 - 9,41
		2024	0 / 25	0,00	0,00 - 13,32
Ambulant	VÄ	2022	≤3 / 172	x	0,10 - 3,22
		2023	0 / 186	0,00	0,00 - 2,02
		2024	0 / 175	0,00	0,00 - 2,15
	KH	2022	≤3 / 221	x	0,08 - 2,52
		2023	≤3 / 279	x	0,06 - 2,00
		2024	4 / 282	1,42	0,55 - 3,59
Selektivvertragliche Leistungen		2022	0 / 0	-	-
		2023	- / -	-	-
		2024	0 / 0	-	-
Bund		2022	≤3 / 393	x	0,14 - 1,84
		2023	≤3 / 465	x	0,04 - 1,21
		2024	4 / 457	0,88	0,34 - 2,23

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse nach Vergleichsgruppen



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	366	0	0,00	100,00	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	ID: 332000 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen)	0,00 % 0/25	0,88 % 4/457
3.1.1	Diagnosestellung		
3.1.1.1	ID: 33_24050 Selbstdiagnostiziert ¹⁹	- 0/0	x % ≤3/4
3.1.1.2	ID: 33_24051 Fremddiagnostiziert ²⁰	- 0/0	x % ≤3/4

¹⁹ bei selbstdiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde.

²⁰ bei fremddiagnostizierten Fällen wurde die Diagnose der nosokomialen postoperativen Wundinfektion nicht beim selben Leistungserbringer gestellt, bei dem auch die dazugehörige Tracer-Operation durchgeführt wurde, sondern bei einem anderen Leistungserbringer.

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	ID: 332000 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen) ²¹	0,00 % 0/25	0,88 % 4/457
3.2.1	ID: 33_25094 Operationen an Lunge und Bronchus (5-32...5-34)	- 0/0	- 0/0
3.2.2	ID: 33_25095 Operationen am Herzen (5-35...5-37)	x % ≤3	21,05 % 4/19
3.2.3	ID: 33_25096 Operationen an den Blutgefäßen (5-38...5-39)	x % ≤3	0,00 % 0/53
3.2.4	ID: 33_25097 Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem (5-40...5-41)	- 0/0	- 0/0
3.2.5	ID: 33_25098 Operationen am Verdauungstrakt (5-42...5-54)	x % ≤3	0,00 % 0/16
3.2.6	ID: 33_25099 Operationen an den Harnorganen (5-55...5-59)	- 0/0	- 0/0
3.2.7	ID: 33_25100 Operationen an den männlichen Genitalorganen (5-60...5-64)	x % ≤3	0,00 % 0/12

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2.8	ID: 33_25101 Operationen an den weiblichen Genitalorganen (5-65...5-71)	- 0/0	0,00 % 0/4
3.2.9	ID: 33_25102 Geburtshilfliche Operationen (5-72...5-75)	- 0/0	- 0/0
3.2.10	ID: 33_25103 Operationen an den Bewegungsorganen (5-78...5-86)	0,00 % 0/20	0,00 % 0/349
3.2.11	ID: 33_25104 Operationen an der Mamma (5-87...5-88)	- 0/0	0,00 % 0/4

²¹ gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.3	ID: 332000 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen)	0,00 % 0/25	0,88 % 4/457
3.3.1	Tage bis zum Versterben nach einer nosokomialen postoperativen Wundinfektion		
3.3.1.1	ID: 33_24052 ≤ 10 Tage	- 0/0	0,00 % 0/4
3.3.1.2	ID: 33_24053 11 - 20 Tage	- 0/0	100,00 % 4/4
3.3.1.3	ID: 33_24054 21 - 30 Tage	- 0/0	0,00 % 0/4

Basisauswertung

QS Dokumentation

NWIF Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

Bogenauslösende Kodes

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
ICD-Kodes gemäß ICD-10-GM				
T81.4 Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert	3.663	17,56	60.327	19,15
K65.09 Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis	2.270	10,88	32.795	10,41
T84.5 Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese	1.289	6,18	21.980	6,98
T82.7 Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	1.253	6,01	21.191	6,73
I33.0 Akute und subakute infektiöse Endokarditis	750	3,60	12.309	3,91
K91.83 Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt	787	3,77	11.459	3,64
T84.6 Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]	652	3,13	10.433	3,31
K65.00 Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)	593	2,84	9.166	2,91
N61 Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	470	2,25	7.147	2,27
K75.0 Leberabszess	441	2,11	7.018	2,23

NWIF Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

Bogenauslösende Kodes

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS)				
5-916.a0 Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut	3.178	15,24	40.777	12,94
5-916.a1 Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten	1.466	7,03	19.165	6,08
5-394.2 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates	398	1,91	6.570	2,09
5-545.0 Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)	402	1,93	6.481	2,06
5-916.a5 Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums	429	2,06	4.834	1,53
5-916.a3 Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen	532	2,55	4.712	1,50

NWIF Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

Bogenauslösende Kodes

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
5-394.1 Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose	192	0,92	3.375	1,07
5-896.1f Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel	276	1,32	3.351	1,06
5-916.a2 Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum	234	1,12	3.141	1,00
5-896.19 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand	227	1,09	3.133	0,99

Aufnahme und Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 20.856		N = 315.089	
Aufnahmequartal				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen und Überlieger)	615	2,95	9.689	3,08
1. Quartal	5.326	25,54	79.321	25,17
2. Quartal	5.193	24,90	79.261	25,16
3. Quartal	5.463	26,19	83.633	26,54
4. Quartal	4.259	20,42	63.185	20,05
Entlassungsquartal				
1. Quartal	4.903	23,51	73.645	23,37
2. Quartal	5.119	24,54	78.177	24,81
3. Quartal	5.449	26,13	83.392	26,47
4. Quartal	5.385	25,82	79.875	25,35

Aufenthaltsdauer im Krankenhaus

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 20.856		N = 315.089	
Verweildauer im Krankenhaus				
≤ 7 Tage	6.149	29,48	97.312	30,88
8 - 14 Tage	4.979	23,87	74.525	23,65
15 - 21 Tage	3.508	16,82	51.648	16,39
22 - 28 Tage	2.190	10,50	31.441	9,98
> 28 Tage	4.030	19,32	60.163	19,09

Patientin / Patient

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 20.856		N = 315.089	
Geschlecht				
(1) männlich	10.829	51,92	168.246	53,40
(2) weiblich	10.027	48,08	146.833	46,60
(3) divers	0	0,00	5	0,00
(8) unbestimmt	0	0,00	5	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 20.856		N = 315.089	
Alter der Patientinnen und Patienten				
18 - 19 Jahre	76	0,36	1.269	0,40
20 - 29 Jahre	740	3,55	11.086	3,52
30 - 39 Jahre	1.283	6,15	19.054	6,05
40 - 49 Jahre	1.555	7,46	24.172	7,67
50 - 59 Jahre	3.021	14,49	45.232	14,36
60 - 69 Jahre	4.769	22,87	74.281	23,57
70 - 79 Jahre	4.822	23,12	70.993	22,53
80 - 89 Jahre	4.049	19,41	60.555	19,22
≥ 90 Jahre	541	2,59	8.447	2,68

Postoperative Wundinfektion

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 20.856		N = 315.089	
Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?				
(0) nein	15.652	75,05	239.053	75,87
(1) ja	5.204	24,95	76.036	24,13
davon: Wundinfektionstiefe ²²				
(1) A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion	1.483	28,50	23.375	30,74
(2) A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion	2.417	46,45	35.240	46,35
(3) A2 mit sekundärer Sepsis	115	2,21	1.692	2,23
(4) A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet	1.080	20,75	13.895	18,27
(5) A3 mit sekundärer Sepsis	109	2,09	1.834	2,41
davon: Wurde im Zusammenhang mit der Diagnose oder der Behandlung eine mikrobiologische Diagnostik durchgeführt (analog den KISSDefinitionen)? ²³				
(0) nein	399	7,67	7.516	9,88
(1) ja	4.805	92,33	68.520	90,12

²² Die Definitionen der Tiefe der postoperativen Wundinfektionen in Anlehnung an die aktuell geltenden KISS-Definitionen des NRZ

²³ während des aktuellen stationären Aufenthaltes oder wenn die mikrobiologische Diagnostik des vorbehandelnden Arztes in der Patientenakte vorliegt

Sozialdaten

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen an Lunge und Bronchus (5-32...5-34)				
5-349.3 Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial	4	0,00	114	0,00

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen am Herzen (5-35...5-37)				
5-377.30 Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation	2.879	1,31	43.160	1,50
5-361.03 Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Arterien	692	0,31	14.531	0,51
5-378.52 Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem	736	0,33	11.701	0,41
5-351.02 Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese)	578	0,26	9.535	0,33
5-377.1 Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem	509	0,23	9.099	0,32
5-361.17 Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz	383	0,17	7.800	0,27
5-361.07 Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz	585	0,27	6.986	0,24

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten
gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
5-377.d Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Verwendung von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder Ereignis-Rekordern mit automatischem Fernüberwachungssystem	214	0,10	6.627	0,23
5-377.50 Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion	367	0,17	5.683	0,20
5-353.1 Valvuloplastik: Mitralklappe, Anuloplastik	398	0,18	5.505	0,19

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen an den Blutgefäßen (5-38...5-39)				
5-385.70 Entfernung und Verschluss von Varizen: Crossektomie und Exhairese: V. saphena magna	2.272	1,03	37.097	1,29
5-381.70 Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis	1.300	0,59	23.189	0,81
5-381.71 Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris	717	0,33	11.646	0,41
5-385.78 Entfernung und Verschluss von Varizen: Crossektomie und Exhairese: Vv. saphenae magna et accessoria(e)	521	0,24	10.013	0,35
5-380.70 Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis	529	0,24	9.357	0,33
5-381.54 Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa	634	0,29	8.987	0,31
5-385.7a Entfernung und Verschluss von Varizen: Crossektomie und Exhairese: V. saphena parva	367	0,17	7.531	0,26
5-380.72 Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea	239	0,11	4.769	0,17
5-393.53 Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes	270	0,12	3.887	0,14

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
5-380.54 Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa	198	0,09	3.821	0,13
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem (5-40...5-41)				
5-407.2 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)	151	0,07	2.207	0,08
5-407.3 Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin	64	0,03	1.599	0,06

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen am Verdauungstrakt (5-42...5-54)				
5-511.11 Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge	7.266	3,30	99.036	3,45
5-469.21 Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch	4.547	2,06	65.658	2,29
5-469.20 Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch	3.220	1,46	42.017	1,46
5-470.11 Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)	3.103	1,41	37.781	1,32
5-530.31 Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]	1.943	0,88	17.056	0,59
5-530.33 Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)	1.113	0,51	12.402	0,43
5-536.47 Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm	833	0,38	10.373	0,36
5-469.00 Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch	708	0,32	9.895	0,34

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten
gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
5-455.41 Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose	553	0,25	8.166	0,28
5-455.75 Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose	580	0,26	7.798	0,27

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen an den Harnorganen (5-55...5-59)				
5-593.20 Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O)	838	0,38	11.060	0,39
5-553.03 Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch	291	0,13	6.094	0,21
5-576.20 Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch	179	0,08	2.520	0,09
5-553.00 Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal	178	0,08	2.509	0,09
5-554.43 Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch	108	0,05	2.159	0,08
5-599.00 Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal	147	0,07	1.822	0,06
5-554.40 Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal	102	0,05	1.384	0,05
5-582.0 Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch	92	0,04	1.308	0,05

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
5-554.41 Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal	77	0,03	1.081	0,04
5-590.51 Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal	43	0,02	1.071	0,04

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen an den männlichen Genitalorganen (5-60...5-64)				
5-604.52 Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie	683	0,31	11.663	0,41
5-604.42 Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Mit regionaler Lymphadenektomie	324	0,15	6.570	0,23
5-640.2 Operationen am Präputium: Zirkumzision	339	0,15	5.659	0,20
5-611 Operation einer Hydrocele testis	338	0,15	4.861	0,17
5-622.5 Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)	325	0,15	4.496	0,16
5-631.1 Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele	158	0,07	2.592	0,09
5-604.51 Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie	152	0,07	2.529	0,09
5-604.12 Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie	142	0,06	2.367	0,08

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
5-631.2 Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide	193	0,09	2.195	0,08
5-646.0 Operationen zur Genitalorganumwandlung: Genitalorgantransformation von weiblich zu männlich	142	0,06	1.901	0,07

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen an den weiblichen Genitalorganen (5-65...5-71)				
5-661.62 Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)	3.104	1,41	38.627	1,35
5-651.92 Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)	2.317	1,05	30.885	1,08
5-653.32 Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch)	2.160	0,98	29.772	1,04
5-704.00 Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material	1.382	0,63	23.125	0,81
5-682.02 Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch)	1.353	0,61	21.114	0,74
5-704.10 Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material	1.174	0,53	18.283	0,64
5-683.03 Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch)	1.371	0,62	16.228	0,57

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
5-657.62 Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch)	1.059	0,48	14.298	0,50
5-683.01 Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal	716	0,33	11.524	0,40
5-683.23 Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)	555	0,25	8.400	0,29

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Geburtshilfliche Operationen (5-72...5-75)				
5-749.11 Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär	5.833	2,65	74.338	2,59
5-749.10 Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär	6.360	2,89	72.927	2,54
5-749.0 Andere Sectio caesarea: Resectio	5.374	2,44	65.966	2,30
5-740.0 Klassische Sectio caesarea: Primär	1.266	0,57	19.018	0,66
5-740.1 Klassische Sectio caesarea: Sekundär	1.453	0,66	15.886	0,55
5-741.0 Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, suprazervikal	21	0,01	2.083	0,07
5-741.1 Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, suprazervikal	54	0,02	1.949	0,07
5-741.3 Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, T-Inzision	45	0,02	266	0,01
5-758.3 Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva	17	0,01	222	0,01
5-758.4 Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva	20	0,01	133	0,00

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen an den Bewegungsorganen (5-78...5-86)				
5-822.g1 Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert	9.594	4,35	127.053	4,43
5-820.00 Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert	7.088	3,22	120.343	4,19
5-812.5 Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell	8.096	3,67	110.509	3,85
5-814.3 Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes	5.234	2,38	81.461	2,84
5-811.2h Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk	1.977	0,90	48.471	1,69
5-794.k6 Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal	3.455	1,57	47.900	1,67
5-812.eh Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk	2.929	1,33	46.133	1,61

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
5-790.5f Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal	2.901	1,32	40.505	1,41
5-820.41 Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert	2.912	1,32	37.639	1,31
5-810.4 Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper	5.856	2,66	35.914	1,25

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Anzahl Tracer-Operationen (Index-Operationen) - Operationen an der Mamma (5-87...5-88)				
5-870.a1 Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten)	2.124	0,96	25.964	0,90
5-870.a2 Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25 % des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant)	1.283	0,58	19.540	0,68
5-872.1 (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie	766	0,35	11.926	0,42
5-870.90 Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation	343	0,16	6.467	0,23
5-884.2 Mammarreduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat	481	0,22	6.348	0,22
5-870.a0 Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation	409	0,19	5.945	0,21

NWITR Erfassungsjahr 2024

Übersicht (Gesamt) / Allgemeine Daten

gem. OPS: Kapitel 5 - Gruppen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
5-872.0 (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie	203	0,09	4.028	0,14
5-870.a3 Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie	361	0,16	3.903	0,14
5-886.30 Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Ohne gewebeverstärkendes Material	186	0,08	3.222	0,11
5-889.1 Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose	209	0,09	2.752	0,10

Beginn und Ende der Behandlung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Behandlungsbeginnquartal				
1. Quartal	14.764	6,70	132.685	4,62
2. Quartal	13.139	5,96	116.129	4,05
3. Quartal	12.163	5,52	102.916	3,59
4. Quartal	12.794	5,81	114.743	4,00
keine Angabe zum Beginn der Behandlung	167.444	76,01	2.403.107	83,74
Behandlungsendequartal				
1. Quartal	14.764	6,70	132.685	4,62
2. Quartal	13.139	5,96	116.128	4,05
3. Quartal	12.163	5,52	102.915	3,59
4. Quartal	12.794	5,81	114.745	4,00
keine Angabe zum Ende der Behandlung	167.444	76,01	2.403.107	83,74

Falllänge

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen und Patienten mit Angaben zu Beginn und Ende der Behandlung	N = 52.860		N = 466.473	
Falllänge				
≤ 7 Tage	18.894	35,74	95.746	20,53
8 - 14 Tage	8.050	15,23	56.234	12,06
15 - 21 Tage	4.919	9,31	44.207	9,48
22 - 28 Tage	4.118	7,79	43.303	9,28
> 28 Tage	16.879	31,93	226.983	48,66

Patientin / Patient

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Geschlecht				
(1) männlich	87.126	39,55	1.115.264	38,87
(2) weiblich	133.167	60,45	1.754.147	61,13
(3) divers	7	0,00	128	0,00
(8) unbestimmt	4	0,00	41	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N = 220.304		N = 2.869.580	
Alter der Patientinnen und Patienten				
18 - 19 Jahre	2.104	0,96	27.028	0,94
20 - 29 Jahre	20.811	9,45	230.151	8,02
30 - 39 Jahre	32.167	14,60	346.547	12,08
40 - 49 Jahre	26.488	12,02	303.573	10,58
50 - 59 Jahre	53.593	24,33	517.307	18,03
60 - 69 Jahre	39.296	17,84	607.621	21,17
70 - 79 Jahre	25.132	11,41	460.205	16,04
80 - 89 Jahre	17.512	7,95	321.560	11,21
≥ 90 Jahre	2.201	1,00	44.326	1,54