

Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung

Schlaganfall-Akutbehandlung

Hessen (SA-HE)

Intrazerebrale Blutung (ICB)

Basisauswertung

Jahresbericht

Erfassungsjahr - EJ2024

Auswertungsjahr - AJ2025

Hessen



© Landesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen GbR

Frankfurter Straße 80-82, 65760 Eschborn

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
Vorzeitiger Abschluss des Falles (Ausgeschlossen von der Basisauswertung)								
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ereignis älter als 7 Tage	100	5,5	53	4,6	39	6,8	8	8
Entlassung bzw. Verlegung vor erster Bildgebung	4	0,2	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...
nur Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung)	21	1,2	≤ 3	...	5	0,9	15	15
bereits vor Aufnahme wurde eine palliative Zielsetzung festgelegt	82	4,5	58	5,0	18	3,1	6	6
sonstiger Grund	73	4,0	33	2,8	16	2,8	24	24
Grundgesamtheit ohne vorzeitigen Fallabschluss	1540	84,6	1017	87,4	494	86,4	29	29
Fachabteilung								
	N	%	N	%	N	%	N	%
Neurologie Schwerpunkt Schlaganfallbehandlung	310	20,1	285	28,0	25	5,1	0	0
Sonstige Neurologie	737	47,9	416	40,9	321	65,0	0	0
Neurochirurgie	247	16,0	247	24,3	0	0,0	0	0
Innere / Geriatrie	150	9,7	6	0,6	120	24,3	24	24
sonstige Fachabteilungen	96	6,2	63	6,2	28	5,7	5	5
Alter								
	N	%	N	%	N	%	N	%
< 45 Jahre	81	5,3	64	6,3	13	2,6	4	4
45 - 54 Jahre	96	6,2	70	6,9	23	4,7	≤ 3	...
55 - 64 Jahre	233	15,1	165	16,2	61	12,3	7	7
65 - 74 Jahre	347	22,5	244	24,0	98	19,8	5	5
75 - 84 Jahre	474	30,8	301	29,6	170	34,4	≤ 3	...
85 - 94 Jahre	296	19,2	166	16,3	123	24,9	7	7
≥ 95 Jahre	13	0,8	7	0,7	6	1,2	0	0
Altersverteilung								
Mittel	72,2		70,9		75,2		66,8	
SD	14,1		14,3		12,8		17,2	
Median	75,0		73,0		77,5		66,0	
Geschlecht								
	N	%	N	%	N	%	N	%
männlich	829	53,8	558	54,9	256	51,8	15	15
weiblich	711	46,2	459	45,1	238	48,2	14	14
divers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Aufnahmegrund: Art der Behandlung								
	N	%	N	%	N	%	N	%
KH-Behandlung vollstationär	1529	99,3	1010	99,3	491	99,4	28	28
KH-Behandlung vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung	4	0,3	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0
vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung	7	0,5	5	0,5	≤ 3	...	≤ 3	...
sonstige Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Aufnahmegrund: Notfallbehandlung								

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Normalfall	102	6,6	49	4,8	53	10,7	0	0
Notfall	1426	92,6	968	95,2	429	86,8	29	29
sonstiger Fall	12	0,8	0	0,0	12	2,4	0	0

Hauptdiagnose: Intrazerebrale Blutung (ICB)

	N	%	N	%	N	%	N	%
I61.0: ICB in die Großhirnhemisphäre, subkortikal	676	43,9	415	40,8	249	50,4	12	12
I61.1: ICB in die Großhirnhemisphäre, kortikal	128	8,3	77	7,6	47	9,5	4	4
I61.2: ICB in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet	85	5,5	47	4,6	35	7,1	≤ 3	...
I61.3: ICB in den Hirnstamm	77	5,0	49	4,8	27	5,5	≤ 3	...
I61.4: ICB in das Kleinhirn	67	4,4	48	4,7	16	3,2	≤ 3	...
I61.5: Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung	206	13,4	165	16,2	41	8,3	0	0
I61.6: ICB an mehreren Lokalisationen	120	7,8	81	8,0	37	7,5	≤ 3	...
I61.8: Sonstige ICB	121	7,9	98	9,6	21	4,3	≤ 3	...
I61.9: ICB, nicht näher bezeichnet	60	3,9	37	3,6	21	4,3	≤ 3	...

Verweildauer (in Tagen)

Mittel	11,2	12,5	8,9	5,8
SD	10,7	11,0	9,8	6,4
Median	9,0	10,0	6,5	3,0

Entlassungsgrund

	N	%	N	%	N	%	N	%
1: Behandlung regulär beendet	387	25,2	229	22,6	152	30,8	6	6
2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	31	2,0	18	1,8	13	2,6	0	0
3: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0
4: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	12	0,8	8	0,8	≤ 3	...	≤ 3	...
5: Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus	423	27,6	273	27,0	139	28,2	11	11
7: Tod	352	23,0	255	25,2	93	18,9	4	4
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)	4	0,3	≤ 3	...	≤ 3	...	≤ 3	...
9: Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	258	16,8	192	19,0	63	12,8	≤ 3	...
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	46	3,0	22	2,2	22	4,5	≤ 3	...
11: Entlassung in ein Hospiz	5	0,3	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0
13: externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
14: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
15: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
17: interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG	12	0,8	8	0,8	4	0,8	0	0
22: Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0
25: Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
28: Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
29: Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
30: Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
Inhouse-Stroke								
ja	N 26	% 1,7	N 18	% 1,8	N 8	% 1,6	N 0	% 0
nein	N 1514	% 98,3	N 999	% 98,2	N 486	% 98,4	N 29	% 29
Zeitintervall Ereignis bis Aufnahme								
≤ 1 h	N 227	% 14,7	N 163	% 16,0	N 59	% 11,9	N 5	% 5
> 1 - 2 h	N 310	% 20,1	N 201	% 19,8	N 105	% 21,3	N 4	% 4
> 2 - 3 h	N 135	% 8,8	N 85	% 8,4	N 47	% 9,5	N ≤ 3	% ...
> 3 - 4 h	N 80	% 5,2	N 51	% 5,0	N 26	% 5,3	N ≤ 3	% ...
> 4 - 5 h	N 58	% 3,8	N 46	% 4,5	N 12	% 2,4	N 0	% 0
> 5 - 6 h	N 44	% 2,9	N 25	% 2,5	N 17	% 3,4	N ≤ 3	% ...
> 6 - 9 h	N 75	% 4,9	N 50	% 4,9	N 24	% 4,9	N ≤ 3	% ...
> 9 - 24 h	N 171	% 11,1	N 107	% 10,5	N 58	% 11,7	N 6	% 6
> 24 - 48 h	N 55	% 3,6	N 28	% 2,8	N 25	% 5,1	N ≤ 3	% ...
> 48 h	N 122	% 7,9	N 76	% 7,5	N 45	% 9,1	N ≤ 3	% ...
Wake-up Stroke	N 67	% 4,4	N 41	% 4,0	N 25	% 5,1	N ≤ 3	% ...
keine Angabe möglich	N 196	% 12,7	N 144	% 14,2	N 51	% 10,3	N ≤ 3	% ...
Versorgungssituation vor Akutereignis								
	N	%	N	%	N	%	N	%
unabhängig zu Hause	N 1266	% 82,2	N 854	% 84,0	N 390	% 78,9	N 22	% 22
Pflege zu Hause	N 144	% 9,4	N 81	% 8,0	N 59	% 11,9	N 4	% 4
Pflege in Institution	N 130	% 8,4	N 82	% 8,1	N 45	% 9,1	N ≤ 3	% ...
Einlieferung								
	N	%	N	%	N	%	N	%
selbst	N 70	% 4,5	N 39	% 3,8	N 28	% 5,7	N ≤ 3	% ...
Vertragsarzt	N 68	% 4,4	N 34	% 3,3	N 33	% 6,7	N ≤ 3	% ...
Rettungsdienst	N 1165	% 75,6	N 737	% 72,5	N 404	% 81,8	N 24	% 24
Übernahme aus anderem Krankenhaus	N 237	% 15,4	N 207	% 20,4	N 29	% 5,9	N ≤ 3	% ...
Vorbehandlung mit Antikoagulanzen								
	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	N 1174	% 76,2	N 786	% 77,3	N 366	% 74,1	N 22	% 22
Vitamin K-Antagonisten	N 43	% 2,8	N 21	% 2,1	N 20	% 4,0	N ≤ 3	% ...
Thrombinhemmer (Dabigatran)	N 8	% 0,5	N 5	% 0,5	N ≤ 3	% ...	N 0	% 0
Faktor Xa Inhibitor (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban)	N 315	% 20,5	N 205	% 20,2	N 105	% 21,3	N 5	% 5
Motorische Ausfälle bei Aufnahme (Arm/Hand und/oder Bein/Fuß)								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	N 926	% 60,1	N 585	% 57,5	N 322	% 65,2	N 19	% 19
nein	N 411	% 26,7	N 258	% 25,4	N 145	% 29,4	N 8	% 8
nicht bestimmbar	N 203	% 13,2	N 174	% 17,1	N 27	% 5,5	N ≤ 3	% ...
Sprachstörungen bei Aufnahme								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	N 501	% 32,5	N 336	% 33,0	N 151	% 30,6	N 14	% 14
nein	N 780	% 50,6	N 473	% 46,5	N 294	% 59,5	N 13	% 13
nicht bestimmbar	N 259	% 16,8	N 208	% 20,5	N 49	% 9,9	N ≤ 3	% ...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sprechstörungen bei Aufnahme								
ja	616	40,0	390	38,3	213	43,1	13	13
nein	635	41,2	405	39,8	218	44,1	12	12
nicht bestimmbar	289	18,8	222	21,8	63	12,8	4	4
Schluckstörungen bei Aufnahme								
ja	433	28,1	288	28,3	137	27,7	8	8
nein	772	50,1	476	46,8	282	57,1	14	14
nicht bestimmbar	335	21,8	253	24,9	75	15,2	7	7
Mod. Rankin-Scale bei Aufnahme								
0: Keine Symptome	56	3,6	35	3,4	19	3,8	≤ 3	...
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	98	6,4	64	6,3	28	5,7	6	6
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	187	12,1	117	11,5	69	14,0	≤ 3	...
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	232	15,1	148	14,6	82	16,6	≤ 3	...
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	321	20,8	189	18,6	125	25,3	7	7
5: Schwere Funktionseinschränkung	646	41,9	464	45,6	171	34,6	11	11
Bildgebung durchgeführt								
keine Bildgebung erfolgt	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0
1. Bildgebung vor Aufnahme	234	15,2	210	20,6	23	4,7	≤ 3	...
1. Bildgebung im eigenen Haus	1304	84,7	805	79,2	471	95,3	28	28
Zeitdauer von Aufnahme bis zur ersten Bildgebung (in Minuten, Inhouse-Stroke ausgeschlossen)								
Mittel		116,2		112,6		126,8		38,7
SD		1382,2		1507,5		1186,6		49,1
Median		19,0		18,0		22,0		18,0
0, 1, 2: Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)								
	N	%	N	%	N	%	N	%
0: nein	1436	93,2	1009	99,2	406	82,2	21	21
1: ja, mit späterer Rückverlegung	10	0,6	≤ 3	...	8	1,6	0	0
2: ja, ohne spätere Rückverlegung	94	6,1	6	0,6	80	16,2	8	8
Verlegungsgrund [1, 2]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
akute Thrombektomie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Sekundärpräventive Revaskularisation der ACI	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
neurochirurgische Intervention bei Blutung	92	88,5	4	50,0	82	93,2	6	6
Intervention bei raumforderndem Insult	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...	0	0
internistische Komplikation	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
keine eigene Stroke Unit	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
fehlende Bettenkapazität	≤ 3	...	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0
Sonstiges	9	8,7	≤ 3	...	4	4,5	≤ 3	...
Barthel-Index bei Aufnahme Blasenkontrolle [0, 1]								

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0: inkontinent	773	53,5	601	59,4	160	38,6	12	12
5: gelegentlicher Verlust	150	10,4	85	8,4	60	14,5	5	5
10: kontinent	523	36,2	325	32,1	194	46,9	4	4

Barthel-Index bei Aufnahme Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	694	48,0	537	53,1	148	35,7	9	9
5: große Unterstützung	256	17,7	165	16,3	86	20,8	5	5
10: geringe Unterstützung	195	13,5	126	12,5	67	16,2	≤ 3	...
15: vollständig selbstständig	301	20,8	183	18,1	113	27,3	5	5

Barthel-Index bei Aufnahme Fortbewegung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	792	54,8	592	58,6	188	45,4	12	12
5: große Unterstützung	226	15,6	150	14,8	74	17,9	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	201	13,9	130	12,9	68	16,4	≤ 3	...
15: vollständig selbstständig	227	15,7	139	13,7	84	20,3	4	4

Schlucktest nach Protokoll nach Ereignis [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	1129	78,1	762	75,4	355	85,7	12	12
nein	71	4,9	56	5,5	11	2,7	4	4
nicht durchführbar	246	17,0	193	19,1	48	11,6	5	5

Diabetes mellitus [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	283	19,6	188	18,6	91	22,0	4	4
nein	1163	80,4	823	81,4	323	78,0	17	17

Vorhofflimmern [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	1127	77,9	801	79,2	311	75,1	15	15
ja, vorbekannt	297	20,5	197	19,5	94	22,7	6	6
ja, neu diagnostiziert	22	1,5	13	1,3	9	2,2	0	0

Früherer Schlaganfall [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	265	18,3	185	18,3	74	17,9	6	6
nein	1181	81,7	826	81,7	340	82,1	15	15

Hypertonie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	1182	81,7	821	81,2	345	83,3	16	16
nein	264	18,3	190	18,8	69	16,7	5	5

Beatmung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	394	27,2	363	35,9	28	6,8	≤ 3	...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
nein	1052	72,8	648	64,1	386	93,2	18	18

Behandlung auf Stroke Unit / Intermediate Care [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	1065	73,7	671	66,4	380	91,8	14	14
nein	381	26,3	340	33,6	34	8,2	7	7

Behandlung auf Intensivstation [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	550	38,0	487	48,2	52	12,6	11	11
nein	896	62,0	524	51,8	362	87,4	10	10

Glasgow Coma Scale

	N	%	N	%	N	%	N	%
3 - 8	412	26,8	301	29,7	105	21,4	6	6
9 - 12	254	16,5	169	16,7	78	15,9	7	7
13 - 15	869	56,6	545	53,7	308	62,7	16	16

Hypertonie bei Aufnahme

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	949	61,6	601	59,1	331	67,0	17	17
nein	591	38,4	416	40,9	163	33,0	12	12

Blutdrucksenkende Therapie innerhalb von 1h nach Aufnahme durchgeführt?

	N	%	N	%	N	%	N	%
keine blutdrucksenkende Therapie durchgeführt	81	8,5	55	9,2	26	7,9	0	0
Blutdrucksenkende Therapie erfolgreich (Def. R-syst < 140 mmHg) durchgeführt	705	74,3	440	73,2	249	75,2	16	16
Blutdrucksenkende Therapie nicht erfolgreich (Def. R-syst < 140 mmHg) durchgeführt	163	17,2	106	17,6	56	16,9	≤ 3	...

INR bei Aufnahme (bei Vorbehandlung mit Vitamin K-Antagonisten)

Mittel	2,9	2,5	3,3	3,0
SD	1,5	1,0	1,8	1,3
Median	2,6	2,6	2,8	3,0

Normalisierung INR (bei Vorbehandlung mit Vitamin K-Antagonisten)

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	32	74,4	17	81,0	14	70,0	≤ 3	...
nein	11	25,6	4	19,0	6	30,0	≤ 3	...

Antagonisierung DOAK (bei Vorbehandlung mit Thrombinhemmer oder Faktor Xa Inhibitor)

	N	%	N	%	N	%	N	%
nicht durchgeführt	134	41,5	81	38,6	49	45,4	4	4
PPSB	102	31,6	57	27,1	44	40,7	≤ 3	...
spezifische Antagonisierung (z.B. Idarucizumab, Andexanet, Ciraparantag)	87	26,9	72	34,3	15	13,9	0	0

EVD - externe Ventrikeldrainage [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
ja	227	15,7	213	21,1	13	3,1	≤ 3	...
nein	1219	84,3	798	78,9	401	96,9	20	20

Operation an Blutung oder Blutungsquelle [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	151	10,4	141	13,9	10	2,4	0	0
nein	1295	89,6	870	86,1	404	97,6	21	21

Endovaskuläre Behandlung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	22	1,5	21	2,1	≤ 3	...	0	0
nein	1424	98,5	990	97,9	413	99,8	21	21

keine der vorgenannten Maßnahmen [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	1092	75,5	684	67,7	390	94,2	18	18
nein	354	24,5	327	32,3	24	5,8	≤ 3	...

Antihypertensiva [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	1133	64,4	797	65,1	321	63,3	15	15
nein	313	17,8	214	17,5	93	18,3	6	6
nein	313	17,8	214	17,5	93	18,3	6	6

Physiotherapie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	154	10,7	107	10,6	41	9,9	6	6
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	1266	87,6	883	87,3	368	88,9	15	15
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	26	1,8	21	2,1	5	1,2	0	0

Logopädie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	276	19,1	210	20,8	57	13,8	9	9
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	1094	75,7	730	72,2	353	85,3	11	11
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	76	5,3	71	7,0	4	1,0	≤ 3	...

Komplikationen (nur im Verlauf erworben) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	451	31,2	342	33,8	105	25,4	4	4
nein	995	68,8	669	66,2	309	74,6	17	17

Symp. Intrazerebrale Blutung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	24	5,3	15	4,4	8	7,6	≤ 3	...
nein	427	94,7	327	95,6	97	92,4	≤ 3	...

Pneumonie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
ja	191	42,4	163	47,7	26	24,8	≤ 3	...
nein	260	57,6	179	52,3	79	75,2	≤ 3	...
Erhöhter Hirndruck [0, 1]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	58	12,9	50	14,6	7	6,7	≤ 3	...
nein	393	87,1	292	85,4	98	93,3	≤ 3	...
DCI (Delayed Cerebral Ischemia) [0, 1]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	4	0,9	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0
nein	447	99,1	339	99,1	104	99,0	4	4
Re-Blutung [0, 1]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	27	6,0	22	6,4	5	4,8	0	0
nein	424	94,0	320	93,6	100	95,2	4	4
Sekundäre Ventrikelblutung [0, 1]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	15	3,3	11	3,2	4	3,8	0	0
nein	436	96,7	331	96,8	101	96,2	4	4
Epileptischer Anfall [0, 1]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	63	14,0	47	13,7	16	15,2	0	0
nein	388	86,0	295	86,3	89	84,8	4	4
Hydrozephalus [0, 1]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	42	9,3	41	12,0	≤ 3	...	0	0
nein	409	90,7	301	88,0	104	99,0	4	4
Hirninfarkt [0, 1]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	20	4,4	17	5,0	≤ 3	...	0	0
nein	431	95,6	325	95,0	102	97,1	4	4
Andere Komplikation(en) [0, 1]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	176	39,0	115	33,6	60	57,1	≤ 3	...
nein	275	61,0	227	66,4	45	42,9	≤ 3	...
Mod. Rankin-Scale bei Entlassung [0, 1]								
	N	%	N	%	N	%	N	%
0: Keine Symptome	84	5,8	51	5,0	30	7,2	≤ 3	...
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	170	11,8	109	10,8	57	13,8	4	4
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	186	12,9	126	12,5	58	14,0	≤ 3	...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	170	11,8	106	10,5	63	15,2	≤ 3	...
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	250	17,3	175	17,3	71	17,1	4	4
5: Schwere Funktionseinschränkung	234	16,2	189	18,7	42	10,1	≤ 3	...
6: Tod	352	24,3	255	25,2	93	22,5	4	4

Barthel-Index bei Entlassung Blasenkontrolle [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: inkontinent	412	37,7	328	43,4	77	24,0	7	7
5: gelegentlicher Verlust	129	11,8	77	10,2	47	14,6	5	5
10: kontinent	553	50,5	351	46,4	197	61,4	5	5

Barthel-Index bei Entlassung Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	267	24,4	218	28,8	47	14,6	≤ 3	...
5: große Unterstützung	230	21,0	158	20,9	66	20,6	6	6
10: geringe Unterstützung	190	17,4	129	17,1	57	17,8	4	4
15: vollständig selbstständig	407	37,2	251	33,2	151	47,0	5	5

Barthel-Index bei Entlassung Fortbewegung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	367	33,5	285	37,7	77	24,0	5	5
5: große Unterstützung	200	18,3	136	18,0	61	19,0	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	215	19,7	140	18,5	71	22,1	4	4
15: vollständig selbstständig	312	28,5	195	25,8	112	34,9	5	5

Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	871	79,6	625	82,7	238	74,1	8	8
nein	223	20,4	131	17,3	83	25,9	9	9

Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde? [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	331	22,9	227	22,5	98	23,7	6	6
nein	1115	77,1	784	77,5	316	76,3	15	15

In der Auswertung wird die mit [0], [1], [2] gekennzeichnete Grundgesamtheit wie folgt betrachtet:

0: Fälle ohne Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)

1: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), mit späterer Rückverlegung

2: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), ohne spätere Rückverlegung