

Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung

Schlaganfall-Akutbehandlung

Hessen (SA-HE)

Subarachnoidalblutung (SAB)

Basisauswertung

Jahresbericht

Erfassungsjahr - EJ2025

Auswertungsjahr - AJ2026

Hessen



© Landesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen GbR

Frankfurter Straße 80-82, 65760 Eschborn

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
Vorzeitiger Abschluss des Falles (Ausgeschlossen von der Basisauswertung)	N	%	N	%	N	%	N	%
Ereignis älter als 7 Tage	52	10,0	34	8,5	17	17,9	≤ 3	...
Entlassung bzw. Verlegung vor erster Bildgebung	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...	0	0,0
nur Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung) (nur gültig für Überlieger 2024-2025)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
nur neurologische Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung)	5	1,0	0	0,0	≤ 3	...	4	19,0
nur geriatrische Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung)	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0	≤ 3	...
bereits vor Aufnahme wurde eine palliative Zielsetzung festgelegt	5	1,0	5	1,2	0	0,0	0	0,0
sonstiger Grund (nur gültig für Überlieger 2024-2025)	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0
Grundgesamtheit ohne vorzeitigen Fallabschluss	453	87,5	362	90,0	76	80,0	15	71,4

Fachabteilung

	N	%	N	%	N	%	N	%
Neurologie Schwerpunkt Schlaganfallbehandlung	51	11,3	50	13,8	≤ 3	...	0	0,0
Sonstige Neurologie	139	30,7	81	22,4	57	75,0	≤ 3	...
Neurochirurgie	202	44,6	202	55,8	0	0,0	0	0,0
Innere / Geriatrie	27	6,0	≤ 3	...	15	19,7	10	66,7
sonstige Fachabteilungen	34	7,5	27	7,5	≤ 3	...	4	26,7

Alter

	N	%	N	%	N	%	N	%
< 45 Jahre	57	12,6	50	13,8	5	6,6	≤ 3	...
45 - 54 Jahre	81	17,9	72	19,9	8	10,5	≤ 3	...
55 - 64 Jahre	128	28,3	107	29,6	18	23,7	≤ 3	...
65 - 74 Jahre	85	18,8	67	18,5	17	22,4	≤ 3	...
75 - 84 Jahre	69	15,2	47	13,0	18	23,7	4	26,7
85 - 94 Jahre	33	7,3	19	5,2	10	13,2	4	26,7
≥ 95 Jahre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Altersverteilung

Mittel	61,9	60,2	68,3	71,1
SD	14,8	14,2	14,9	18,4
Median	61,0	59,0	69,0	81,0

Geschlecht

	N	%	N	%	N	%	N	%
männlich	192	42,4	155	42,8	31	40,8	6	40,0
weiblich	261	57,6	207	57,2	45	59,2	9	60,0
divers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
unbestimmt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Aufnahmegrund: Art der Behandlung

	N	%	N	%	N	%	N	%
KH-Behandlung vollstationär	449	99,1	359	99,2	76	100,0	14	93,3
KH-Behandlung vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0
vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...
sonstige Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Aufnahmegrund: Notfallbehandlung								
Normalfall	24	5,3	14	3,9	9	11,8	≤ 3	...
Notfall	429	94,7	348	96,1	67	88,2	14	93,3
sonstiger Fall	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Hauptdiagnose: Subarachnoidalblutung (SAB)

	N	%	N	%	N	%	N	%
I60.0: SAB vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend	34	7,5	33	9,1	≤ 3	...	0	0,0
I60.1: SAB von der A. cerebri media ausgehend	53	11,7	48	13,3	4	5,3	≤ 3	...
I60.2: SAB von der A. communicans anterior ausgehend	84	18,5	73	20,2	11	14,5	0	0,0
I60.3: SAB von der A. communicans posterior ausgehend	22	4,9	21	5,8	0	0,0	≤ 3	...
I60.4: SAB von der A. basilaris ausgehend	18	4,0	17	4,7	≤ 3	...	0	0,0
I60.5: SAB von der A. vertebralis ausgehend	12	2,6	12	3,3	0	0,0	0	0,0
I60.6: SAB von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend	33	7,3	28	7,7	4	5,3	≤ 3	...
I60.7: SAB von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend	45	9,9	35	9,7	7	9,2	≤ 3	...
I60.8: Sonstige SAB	107	23,6	71	19,6	32	42,1	4	26,7
I60.9: SAB nicht näher bezeichnet	45	9,9	24	6,6	16	21,1	5	33,3

Verweildauer (in Tagen)

Mittel	14,1	16,5	4,7	3,6
SD	12,9	13,0	6,9	4,0
Median	11,0	15,0	1,5	2,0

Entlassungsgrund

	N	%	N	%	N	%	N	%
1: Behandlung regulär beendet	160	35,3	131	36,2	25	32,9	4	26,7
2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	9	2,0	7	1,9	≤ 3	...	0	0,0
3: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0
4: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	7	1,5	6	1,7	≤ 3	...	0	0,0
5: Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus	138	30,5	94	26,0	36	47,4	8	53,3
7: Tod	87	19,2	79	21,8	7	9,2	≤ 3	...
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)	≤ 3	...	0	0,0	≤ 3	...	0	0,0
9: Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	43	9,5	41	11,3	≤ 3	...	≤ 3	...
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	5	1,1	≤ 3	...	≤ 3	...	≤ 3	...
11: Entlassung in ein Hospiz	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13: externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15: Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
17: interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0
22: Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25: Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
28: Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
29: Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
30: Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Inhouse-Stroke

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	8	1,8	4	1,1	4	5,3	0	0,0
nein	445	98,2	358	98,9	72	94,7	15	100,0

Zeitintervall Ereignis bis Aufnahme

	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 1 h	61	13,5	44	12,2	10	13,2	7	46,7
> 1 - 2 h	81	17,9	67	18,5	13	17,1	≤ 3	...
> 2 - 3 h	29	6,4	23	6,4	5	6,6	≤ 3	...
> 3 - 4 h	34	7,5	29	8,0	5	6,6	0	0,0
> 4 - 5 h	20	4,4	18	5,0	≤ 3	...	≤ 3	...
> 5 - 6 h	14	3,1	11	3,0	≤ 3	...	≤ 3	...
> 6 - 9 h	16	3,5	13	3,6	≤ 3	...	0	0,0
> 9 - 24 h	48	10,6	39	10,8	8	10,5	≤ 3	...
> 24 - 48 h	21	4,6	18	5,0	≤ 3	...	0	0,0
> 48 h	71	15,7	55	15,2	15	19,7	≤ 3	...
Wake-up Stroke	11	2,4	7	1,9	≤ 3	...	≤ 3	...
keine Angabe möglich	47	10,4	38	10,5	8	10,5	≤ 3	...

Versorgungssituation vor Akutereignis

	N	%	N	%	N	%	N	%
unabhängig zu Hause	412	90,9	344	95,0	59	77,6	9	60,0
Pflege zu Hause	20	4,4	10	2,8	7	9,2	≤ 3	...
Pflege in Institution	21	4,6	8	2,2	10	13,2	≤ 3	...

Einlieferung

	N	%	N	%	N	%	N	%
selbst	39	8,6	26	7,2	10	13,2	≤ 3	...
Vertragsarzt	20	4,4	14	3,9	6	7,9	0	0,0
Rettungsdienst	258	57,0	191	52,8	55	72,4	12	80,0
Übernahme aus anderem Krankenhaus	136	30,0	131	36,2	5	6,6	0	0,0

Vorbehandlung mit Antikoagulanzen

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	420	92,7	339	93,6	70	92,1	11	73,3
Vitamin K-Antagonisten	5	1,1	4	1,1	≤ 3	...	0	0,0
Thrombinhemmer (Dabigatran)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Faktor Xa Inhibitor (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban)	28	6,2	19	5,2	5	6,6	4	26,7

Motorische Ausfälle bei Aufnahme (Arm/Hand und/oder Bein/Fuß)

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	69	15,2	51	14,1	13	17,1	5	33,3
nein	284	62,7	217	59,9	58	76,3	9	60,0
nicht bestimmbar	100	22,1	94	26,0	5	6,6	≤ 3	...

Sprachstörungen bei Aufnahme

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	58	12,8	44	12,2	10	13,2	4	26,7

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
nein	283	62,5	213	58,8	61	80,3	9	60,0
nicht bestimmbar	112	24,7	105	29,0	5	6,6	≤ 3	...

Sprechstörungen bei Aufnahme

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	55	12,1	37	10,2	13	17,1	5	33,3
nein	284	62,7	218	60,2	58	76,3	8	53,3
nicht bestimmbar	114	25,2	107	29,6	5	6,6	≤ 3	...

Schluckstörungen bei Aufnahme

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	33	7,3	28	7,7	5	6,6	0	0,0
nein	306	67,5	232	64,1	63	82,9	11	73,3
nicht bestimmbar	114	25,2	102	28,2	8	10,5	4	26,7

Mod. Rankin-Scale bei Aufnahme

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: Keine Symptome	45	9,9	31	8,6	13	17,1	≤ 3	...
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	79	17,4	63	17,4	13	17,1	≤ 3	...
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	90	19,9	67	18,5	19	25,0	4	26,7
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	55	12,1	41	11,3	13	17,1	≤ 3	...
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	48	10,6	37	10,2	11	14,5	0	0,0
5: Schwere Funktionseinschränkung	136	30,0	123	34,0	7	9,2	6	40,0

Bildgebung durchgeführt

	N	%	N	%	N	%	N	%
keine Bildgebung erfolgt	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0
1. Bildgebung vor Aufnahme	137	30,2	132	36,5	4	5,3	≤ 3	...
1. Bildgebung im eigenen Haus	314	69,3	228	63,0	72	94,7	14	93,3

Zeitdauer von Aufnahme bis zur ersten Bildgebung (in Minuten, Inhouse-Stroke ausgeschlossen)

	N	%	N	%	N	%	N	%
Mittel		105,3		111,8		73,4		160,3
SD		389,8		451,7		80,7		212,8
Median		29,0		27,0		40,0		78,5

0, 1, 2: Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: nein	399	88,1	352	97,2	40	52,6	7	46,7
1: ja, mit späterer Rückverlegung	5	1,1	≤ 3	...	≤ 3	...	≤ 3	...
2: ja, ohne spätere Rückverlegung	49	10,8	9	2,5	33	43,4	7	46,7

Verlegungsgrund [1, 2]

	N	%	N	%	N	%	N	%
akute Thrombektomie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sekundärpräventive Revaskularisation der ACI	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
neurochirurgische Intervention bei Blutung	46	85,2	6	60,0	35	97,2	5	62,5
Intervention bei raumforderndem Insult	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
internistische Komplikation	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0
keine eigene Stroke Unit	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0	≤ 3	...
fehlende Bettenkapazität	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0	0	0,0
Sonstiges	4	7,4	≤ 3	...	≤ 3	...	≤ 3	...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Barthel-Index bei Aufnahme Blasenkontrolle [0, 1]								
0: inkontinent	169	41,8	157	44,5	9	20,9	≤ 3	...
5: gelegentlicher Verlust	37	9,2	32	9,1	5	11,6	0	0,0
10: kontinent	198	49,0	164	46,5	29	67,4	5	62,5

Barthel-Index bei Aufnahme Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	151	37,4	144	40,8	5	11,6	≤ 3	...
5: große Unterstützung	38	9,4	33	9,3	4	9,3	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	65	16,1	53	15,0	8	18,6	4	50,0
15: vollständig selbstständig	150	37,1	123	34,8	26	60,5	≤ 3	...

Barthel-Index bei Aufnahme Fortbewegung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	162	40,1	154	43,6	6	14,0	≤ 3	...
5: große Unterstützung	44	10,9	36	10,2	6	14,0	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	63	15,6	52	14,7	8	18,6	≤ 3	...
15: vollständig selbstständig	135	33,4	111	31,4	23	53,5	≤ 3	...

Schlucktest nach Protokoll nach Ereignis [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	280	69,3	234	66,3	40	93,0	6	75,0
nein	27	6,7	26	7,4	0	0,0	≤ 3	...
nicht durchführbar	97	24,0	93	26,3	≤ 3	...	≤ 3	...

Diabetes mellitus [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	44	10,9	35	9,9	6	14,0	≤ 3	...
nein	360	89,1	318	90,1	37	86,0	5	62,5

Vorhofflimmern [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	373	92,3	330	93,5	37	86,0	6	75,0
ja, vorbekannt	27	6,7	19	5,4	6	14,0	≤ 3	...
ja, neu diagnostiziert	4	1,0	4	1,1	0	0,0	0	0,0

Früherer Schlaganfall [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	36	8,9	23	6,5	11	25,6	≤ 3	...
nein	368	91,1	330	93,5	32	74,4	6	75,0

Hypertonie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	231	57,2	195	55,2	29	67,4	7	87,5
nein	173	42,8	158	44,8	14	32,6	≤ 3	...

Beatmung [0, 1]

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	206	51,0	201	56,9	5	11,6	0	0,0
nein	198	49,0	152	43,1	38	88,4	8	100,0

Behandlung auf Stroke Unit / Intermediate Care [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	189	46,8	149	42,2	38	88,4	≤ 3	...
nein	215	53,2	204	57,8	5	11,6	6	75,0

Behandlung auf Intensivstation [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	264	65,3	256	72,5	6	14,0	≤ 3	...
nein	140	34,7	97	27,5	37	86,0	6	75,0

WFNS

	N	%	N	%	N	%	N	%
Grad I	190	41,9	138	38,1	48	63,2	4	26,7
Grad II	92	20,3	70	19,3	17	22,4	5	33,3
Grad III	50	11,0	43	11,9	4	5,3	≤ 3	...
Grad IV	42	9,3	37	10,2	≤ 3	...	≤ 3	...
Grad V	79	17,4	74	20,4	5	6,6	0	0,0

CT-, MR- bzw. DS-Angiographie (bei Bildgebung vor Aufnahme oder im eigenen Haus)

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	33	7,3	19	5,3	8	10,5	6	40,0
vor Aufnahme	79	17,5	74	20,6	4	5,3	≤ 3	...
direkt im Anschluss an native Bildgebung	305	67,6	240	66,7	57	75,0	8	53,3
nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung aber spätestens am Folgetag der Aufnahme	24	5,3	20	5,6	4	5,3	0	0,0
nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung und später als am Folgetag der Aufnahme	10	2,2	7	1,9	≤ 3	...	0	0,0

Aneurysma in Bildgebung nachgewiesen (bei Fällen mit CT-, MR- bzw. DS-Angiographie)

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	250	59,8	225	66,0	20	29,4	5	55,6
nein	168	40,2	116	34,0	48	70,6	4	44,4

EVD - externe Ventrikeldrainage [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	184	45,5	181	51,3	≤ 3	...	0	0,0
nein	220	54,5	172	48,7	40	93,0	8	100,0

Operation an Blutung oder Blutungsquelle [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	71	17,6	71	20,1	0	0,0	0	0,0
nein	333	82,4	282	79,9	43	100,0	8	100,0

Endovaskuläre Behandlung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	141	34,9	141	39,9	0	0,0	0	0,0
nein	263	65,1	212	60,1	43	100,0	8	100,0

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
--	---------------	--	---	--	---	--	--	--

keine der vorgenannten Maßnahmen [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	161	39,9	113	32,0	40	93,0	8	100,0
nein	243	60,1	240	68,0	≤ 3	...	0	0,0

Zeitdauer von Aufnahme bis zur Intervention (Inhouse-Stroke ausgeschlossen) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 1 h	19	9,5	19	9,5	0	0,0	0	0,0
> 1 h - ≤ 1,5 h	15	7,5	15	7,5	0	0,0	0	0,0
> 1,5 h - ≤ 2,5 h	18	9,0	18	9,0	0	0,0	0	0,0
> 2,5 h - ≤ 4 h	22	10,9	22	10,9	0	0,0	0	0,0
> 4 h - ≤ 24 h	103	51,2	103	51,2	0	0,0	0	0,0
> 24 h	24	11,9	24	11,9	0	0,0	0	0,0

Zeitdauer von Aufnahme bis zur Intervention (in Stunden, Inhouse-Stroke ausgeschlossen) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
Mittel		21,3		21,3		-		-
SD		53,3		53,3		-		-
Median		6,3		6,3		-		-

Antihypertensiva [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	286	70,8	246	69,7	33	76,7	7	87,5
nein	118	29,2	107	30,3	10	23,3	≤ 3	...

Physiotherapie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	39	9,7	32	9,1	5	11,6	≤ 3	...
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	358	88,6	315	89,2	37	86,0	6	75,0
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	7	1,7	6	1,7	≤ 3	...	0	0,0

Logopädie [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
nein	122	30,2	112	31,7	6	14,0	4	50,0
Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme	246	60,9	205	58,1	37	86,0	4	50,0
Beginn > 2 Tage nach Aufnahme	36	8,9	36	10,2	0	0,0	0	0,0

Komplikationen (nur im Verlauf erworben) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	181	44,8	171	48,4	8	18,6	≤ 3	...
nein	223	55,2	182	51,6	35	81,4	6	75,0

Sympt. Intrazerebrale Blutung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	8	2,0	6	1,7	≤ 3	...	≤ 3	...
nein	396	98,0	347	98,3	42	97,7	7	87,5

Pneumonie [0, 1]

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	84	20,8	84	23,8	0	0,0	0	0,0
nein	320	79,2	269	76,2	43	100,0	8	100,0

Erhöhter Hirndruck [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	28	6,9	28	7,9	0	0,0	0	0,0
nein	376	93,1	325	92,1	43	100,0	8	100,0

DCI (Delayed Cerebral Ischemia) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	14	3,5	14	4,0	0	0,0	0	0,0
nein	390	96,5	339	96,0	43	100,0	8	100,0

Re-Blutung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	7	1,7	7	2,0	0	0,0	0	0,0
nein	397	98,3	346	98,0	43	100,0	8	100,0

Sekundäre Ventrikelblutung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	4	1,0	≤ 3	...	≤ 3	...	0	0,0
nein	400	99,0	350	99,2	42	97,7	8	100,0

Epileptischer Anfall [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	32	7,9	29	8,2	≤ 3	...	≤ 3	...
nein	372	92,1	324	91,8	41	95,3	7	87,5

Hydrozephalus [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	42	10,4	42	11,9	0	0,0	0	0,0
nein	362	89,6	311	88,1	43	100,0	8	100,0

Hirnfarkt [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	40	9,9	39	11,0	≤ 3	...	0	0,0
nein	364	90,1	314	89,0	42	97,7	8	100,0

Andere Komplikation(en) [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	60	14,9	55	15,6	5	11,6	0	0,0
nein	344	85,1	298	84,4	38	88,4	8	100,0

Mod. Rankin-Scale bei Entlassung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: Keine Symptome	84	20,8	66	18,7	17	39,5	≤ 3	...
1: Keine wesentliche Funktionseinschränkung	68	16,8	58	16,4	8	18,6	≤ 3	...

	Hessen gesamt		Vergleichskollektiv überregionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv regionale Stroke Unit		Vergleichskollektiv ohne Stroke Unit	
2: Geringgradige Funktionseinschränkung	44	10,9	35	9,9	7	16,3	≤ 3	...
3: Mäßiggradige Funktionseinschränkung	23	5,7	22	6,2	≤ 3	...	0	0,0
4: Mittelschwere Funktionseinschränkung	34	8,4	30	8,5	≤ 3	...	≤ 3	...
5: Schwere Funktionseinschränkung	65	16,1	64	18,1	0	0,0	≤ 3	...
6: Tod	86	21,3	78	22,1	7	16,3	≤ 3	...

Barthel-Index bei Entlassung Blasenkontrolle [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: inkontinent	95	29,9	92	33,5	≤ 3	...	≤ 3	...
5: gelegentlicher Verlust	27	8,5	21	7,6	6	16,7	0	0,0
10: kontinent	196	61,6	162	58,9	29	80,6	5	71,4

Barthel-Index bei Entlassung Lagewechsel Bett-Stuhl [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	78	24,5	77	28,0	0	0,0	≤ 3	...
5: große Unterstützung	31	9,7	28	10,2	≤ 3	...	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	44	13,8	37	13,5	5	13,9	≤ 3	...
15: vollständig selbstständig	165	51,9	133	48,4	29	80,6	≤ 3	...

Barthel-Index bei Entlassung Fortbewegung [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
0: vollständig abhängig	90	28,3	87	31,6	≤ 3	...	≤ 3	...
5: große Unterstützung	32	10,1	28	10,2	≤ 3	...	≤ 3	...
10: geringe Unterstützung	49	15,4	39	14,2	8	22,2	≤ 3	...
15: vollständig selbstständig	147	46,2	121	44,0	23	63,9	≤ 3	...

Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	226	71,1	205	74,5	18	50,0	≤ 3	...
nein	92	28,9	70	25,5	18	50,0	4	57,1

Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde? [0, 1]

	N	%	N	%	N	%	N	%
ja	60	14,9	52	14,7	5	11,6	≤ 3	...
nein	344	85,1	301	85,3	38	88,4	5	62,5

In der Auswertung wird die mit [0], [1], [2] gekennzeichnete Grundgesamtheit wie folgt betrachtet:

0: Fälle ohne Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme)

1: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), mit späterer Rückverlegung

2: nach Primärdiagnostik / -therapie verlegte Fälle (innerhalb 12 h nach Aufnahme), ohne spätere Rückverlegung